



FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

Přípravný kurs z matematiky

Edita Kolářová

Obsah

1	Přehled použité symboliky	3
2	Základní pojmy matematické logiky a teorie množin	4
2.1	Elementy matematické logiky	4
2.2	Základní operace s množinami	5
2.3	Axiomy, definice, věty a důkazy	6
3	Úpravy algebraických výrazů	8
4	Rovnice	11
4.1	Rovnice lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou, parametrické	11
4.2	Rovnice vyššího stupně a iracionální rovnice	16
4.3	Soustavy lineárních rovnic	17
5	Řešení nerovnic	22
5.1	Operace s nerovnicemi	22
5.2	Lineární nerovnice	23
5.3	Kvadratická nerovnice	25
5.4	Nerovnice s absolutními hodnotami	26
5.5	Iracionální nerovnice a soustavy nerovnic	26
6	Elementární funkce	30
6.1	Lineární funkce	30
6.2	Kvadratická funkce	32
6.3	Mocninná funkce	34
6.4	Exponenciální funkce a logaritmická funkce	38
6.5	Logaritmické a exponenciální rovnice	39
7	Vlastnosti funkce jedné proměnné	43
7.1	Vlastnosti a druhy funkcí	43
7.2	Inverzní funkce	46
8	Goniometrické funkce	49
8.1	Oblouková míra	49
8.2	Goniometrické funkce	50
8.3	Goniometrické rovnice	54
9	Komplexní čísla	57
9.1	Algebraický tvar komplexního čísla	57
9.2	Goniometrický tvar komplexního čísla	58
9.3	Moivreova věta	59
9.4	Řešení binomických rovnic v \mathbb{C}	59

10	Vektorová algebra a analytická geometrie	63
10.1	Základní operace s vektory	63
10.2	Přímka v rovině	63
10.3	Přímka v prostoru a rovnice roviny	65
10.4	Kuželosečky v rovině	67
11	Posloupnosti a řady	72
11.1	Aritmetická a geometrická posloupnost	72
11.2	Nekonečná geometrická řada	75
12	Kombinatorika	78
12.1	Permutace, variace a kombinace	78
12.2	Binomická věta	80

1 Přehled použité symboliky

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ množina všech přirozených čísel

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ množina všech celých čísel

$\mathbb{Q} = \{p/q; p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ množina všech racionálních čísel

\mathbb{R} množina všech reálných čísel

\mathbb{R}^+ množina všech reálných kladných čísel

$\mathbb{C} = \{x + iy; x, y \in \mathbb{R}\}$ množina všech komplexních čísel

$\{\}, \emptyset$ prázdná množina

$a \in \mathcal{M}$ a je prvek množiny \mathcal{M}

$a \notin \mathcal{M}$ a není prvek množiny \mathcal{M}

$\{x \in \mathcal{M}; v(x)\}$ množina všech prvků množiny \mathcal{M} s vlastností v

$P \wedge Q$ konjunkce výroků P, Q

$P \vee Q$ disjunkce výroků P, Q

$P \Rightarrow Q$ P implikuje Q

$P \Leftrightarrow Q$ ekvivalence výroků P a Q

\forall obecný kvantifikátor (každý...)

\exists existenční kvantifikátor (existuje...)

$\mathcal{M} \subset \mathcal{N}$ \mathcal{M} je podmnožina \mathcal{N}

$\mathcal{M} = \mathcal{N}$ $(\mathcal{M} \subset \mathcal{N}) \wedge (\mathcal{N} \subset \mathcal{M})$; \mathcal{M} se rovná \mathcal{N}

$\mathcal{M} \cup \mathcal{N}$ $\{x; x \in \mathcal{M} \vee x \in \mathcal{N}\}$ – sjednocení množin

$\mathcal{M} \cap \mathcal{N}$ $\{x; x \in \mathcal{M} \wedge x \in \mathcal{N}\}$ – průnik množin

$\mathcal{M} - \mathcal{N}$ $\{x; x \in \mathcal{M} \wedge x \notin \mathcal{N}\}$

$A[a_1; a_2; a_3]$ bod o souřadnicích a_1, a_2, a_3

$\vec{u} = (u_1; u_2)$ vektor o složkách u_1, u_2

$|AB|$ vzdálenost bodů A, B ; velikost úsečky AB

$|a|, |z|$ absolutní hodnota reálného resp. komplexního čísla

2 Základní pojmy matematické logiky a teorie množin

2.1 Elementy matematické logiky

Výrok je vyslovená nebo napsaná myšlenka, která sděluje něco, co může být pouze pravdivé nebo nepravdivé. Jednoduché výroky označujeme velkými písmeny, např. A, B, V, \dots . Pomocí logických spojek dostáváme složené výroky.

Nejdůležitější jsou:

\bar{A} (*non* A ; A' ; $\neg A$; ...) **negace** výroku A (není pravda, že A)

$A \wedge B$ **konjunkce** (A a zároveň B)

$A \vee B$ **disjunkce** (A nebo B ; platí alespoň jeden)

$A \Rightarrow B$ **implikace** (jestliže A , pak B ; z A plyne B)

$A \Leftrightarrow B$ **ekvivalence** (A platí tehdy a jen tehdy, když platí B ;
 A platí právě tehdy, když platí B)

Kvantifikované výroky jsou výroky, udávající počet:

\forall **obecný kvantifikátor** (čteme: ke každému, pro každé, pro všechna) vyjadřující, že každý (všichni, libovolný, kterýkoliv) uvažovaný objekt má - nebo nemá - požadovanou vlastnost.

\exists **existenční kvantifikátor** (čteme: existuje alespoň jeden) vyjadřuje, že některé (alespoň jeden, někteří, lze nalézt, existuje,...) objekty mají vlastnost, o kterou jde.

Příklad 2.1 Výrok A je "rok má 13 měsíců" a výrok B je " $2 \times 2 = 4$." Utvořte $\bar{A}, A \vee B, A \wedge B, A \Rightarrow B, A \Leftrightarrow B$ a rozhodněte, jsou-li pravdivé nebo nepravdivé.

Řešení:

\bar{A} : "rok nemá 13 měsíců" - pravdivý výrok

$A \vee B$: "rok má 13 měsíců nebo $2 \times 2 = 4$ " - pravdivý výrok

$A \wedge B$: "rok má 13 měsíců a $2 \times 2 = 4$ " - nepravdivý výrok

$A \Rightarrow B$: " má-li rok 13 měsíců, pak $2 \times 2 = 4$ " - pravdivý

$A \Leftrightarrow B$: "rok má 13 měsíců právě tehdy, je-li $2 \times 2 = 4$ " - nepravdivý výrok

Příklad 2.2 Vyslovte negaci výroku A :

a) Všechny kořeny mnohočlenu jsou rovny nule.

b) Ne všechna reálná čísla jsou kladná.

c) $2 < -7$

d) Levná výroba proudu.

Řešení:

a) Alespoň jeden kořen mnohočlenu je nenulový;

b) Všechna reálná čísla jsou kladná;

c) $2 \geq -7$;

d) není výrok

Příklad 2.3 Výrok A "číslo a je dělitelné osmi", výrok B "číslo a je dělitelné dvěma". Formulujte $A \Rightarrow B$, a rozhodněte zda je pravdivý.

Řešení:

Je-li číslo a dělitelné osmi, pak je dělitelné dvěma. Pravdivá implikace

2.2 Základní operace s množinami

Množinou rozumíme souhrn libovolných, navzájem různých objektů, které mají určitou vlastnost. Základní operace s množinami :

$\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ inkluze množin \mathcal{A}, \mathcal{B}

$\mathcal{A} = \mathcal{B}$ rovnost množin \mathcal{A}, \mathcal{B}


$\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ sjednocení množin


$\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ průnik množin


$\mathcal{A} - \mathcal{B}$ rozdíl množin ($\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$)


$\mathcal{A}'_{\mathcal{B}}$ doplněk množiny \mathcal{A} v množině \mathcal{B}


Připomínáme ještě **intervaly**, jejich názvy, znázornění na číselné ose:


uzavřený interval $\langle a; b \rangle = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$ 


otevřený interval $(a; b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ 


polootevřený interval $(a; b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$ 

(polouzavřený) $\langle a; b \rangle = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$ 

neomezený interval $\langle a; \infty \rangle = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x\}$ 

$(a; \infty) = \{x \in \mathbb{R}; a < x\}$ 

$(-\infty; b] = \{x \in \mathbb{R}; x \leq b\}$ 

$(-\infty; b) = \{x \in \mathbb{R}; x < b\}$ 

oboustranně neomezený interval $(-\infty; \infty) = \mathbb{R}$ 

Příklad 2.4 \mathcal{M} je množina všech sudých čísel, \mathcal{P} množina všech lichých čísel, která nejsou dělitelná třemi, \mathcal{R} množina všech čísel, která jsou dělitelná třemi. Určete $\mathcal{M} \cap \mathcal{R}$, $\mathcal{M} \cup \mathcal{P} \cup \mathcal{R}$, $\mathcal{P} \cap \mathcal{R}$.

Řešení:

$\mathcal{M} \cup \mathcal{P} \cup \mathcal{R} = \mathbb{Z}$

$\mathcal{M} \cap \mathcal{R}$ množina všech celých čísel dělitelných šesti

$\mathcal{P} \cap \mathcal{R} = \{ \}$

Příklad 2.5 \mathcal{M} je množina všech sudých přirozených čísel menších než deset. Najděte všechny její podmnožiny.

Řešení:

$$\mathcal{M} = \{2, 4, 6, 8\}$$

jednoprvkové $\{2\}, \{4\}, \{6\}, \{8\}$

dvoupvkové $\{2, 4\}, \{2, 6\}, \{2, 8\}, \{4, 6\}, \{4, 8\}, \{6, 8\}$

trojprvkové $\{2, 4, 6\}, \{2, 4, 8\}, \{4, 6, 8\}, \{2, 6, 8\}$

čtyřprvkové $\{2, 4, 6, 8\}$

množina prázdná

2.3 Axiomy, definice, věty a důkazy

Základem logické výstavby matematiky je soubor **axiomů**, t.j. matematických výroků, které se považují za pravdivé a nedokazují se. K zavedení nových pojmů slouží **definice**, která stanoví název pojmu a určí jeho základní vlastnosti. **Věta** v matematice je pravdivý výrok, který musíme logicky odvodit - dokázat - z axiomů, definic a dříve dokázaných vět. Podle použitých postupů rozlišujeme důkaz přímý, nepřímý, důkaz sporem, důkaz matematickou indukcí.

Příklad 2.6 *Věta: Součin dvou libovolných sudých čísel je dělitelný čtyřmi.*

Důkaz přímý:

Jde o součin $2l \cdot 2k = 4lk$ ($l, k \in \mathbb{Z}$) a to bylo dokázat.

Příklad 2.7 *Věta: Necht rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ má celočíselné koeficienty, $a \neq 0, b$ je číslo liché. Dokažte, že rovnice nemůže mít dvojnásobný kořen.*

Důkaz sporem:

Předpokládáme, že rovnice má dvojnásobný kořen. Pak diskriminant je nulový. Víme, že $b = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$. Tedy $D = (2k + 1)^2 - 4ac = 0 \Rightarrow 4k^2 + 4k + 1 = 4ac$. Na levé straně rovnice je liché číslo, na pravé straně sudé a to je spor. Neplatí tedy předpoklad, že kvadratická rovnice má za daných podmínek dvojnásobný kořen.

Příklad 2.8 *Matematickou indukcí dokažte, že součet čtverců prvních n přirozených čísel je roven $S_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.*

Důkaz:

Matematickou indukcí dokazujeme výrok $V(n)$ tak, že nejprve dokážeme platnost $V(a)$, kde a je nejmenší přirozené číslo pro danou úlohu. Pak předpokládáme platnost $V(n)$ a ukážeme platnost implikace $V(n) \Rightarrow V(n+1)$. Pak $V(n)$ platí pro všechna n .

V našem případě:

$$V(1) : S_1 = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1, \text{ což odpovídá } S_1 = 1^2.$$

$$\text{Předpokládáme } V(n) : S_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

$$\text{Počítáme } V(n+1) : S_{n+1} = S_n + (n+1)^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + (n+1)^2 = \frac{1}{6}(n+1)(2n^2+7n+6) = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3).$$

Příklad 2.9 Necht množina \mathcal{M} je množina všech řešení rovnice $\cos \frac{\pi x}{2} = 0$, množina \mathcal{N} je množina všech řešení rovnice $\sin \pi x = 0$. Najděte $\mathcal{M} \cup \mathcal{N}$, $\mathcal{M} \cap \mathcal{N}$.

[$\mathcal{M} \cup \mathcal{N} = \mathbb{Z}$; $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} =$ kladná a záporná lichá čísla]

Příklad 2.10 Najděte sjednocení a průnik intervalů:

a) $\langle 2; 3 \rangle$ a $\langle -1; \infty \rangle$

b) $(-\infty; 3)$ a $(-8; 15)$

[a) $\langle -1; \infty \rangle, \langle 2; 3 \rangle$ b) $(-\infty; 15), (-8; 3)$]

Příklad 2.11 Přímým důkazem dokažte:

a) Zvětší-li se číslo a o x , zvětší se jeho druhá mocnina o $x(2a + x)$.

b) Zvětší-li se číslo x o h , zvětší se jeho dekadický logaritmus o $\log(1 + \frac{h}{x})$.

c) Součet dvou čísel lichých je sudé číslo.

Příklad 2.12 Sporem dokažte:

a) Rovnice $ax = b$, kde $a \neq 0$, má jediné řešení.

b) V každém trojúhelníku leží proti stejným úhlům stejné strany.

Příklad 2.13 Metodou matematické indukce dokažte:

a) $1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-1} = \frac{1}{2}(3^n - 1)$

b) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

c) $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(2n-1)(2n+1)$

3 Úpravy algebraických výrazů

Algebraický výraz je zápis, který je správně vytvořen z matematických operačních znaků, čísel, proměnných, výsledků operací a hodnot funkcí. Při úpravách používáme poznatků o mocninách, odmocninách, zlomcích a mnohočlenech tak, abychom výraz převedli na nejjednodušší tvar. Nutnou součástí řešení jsou podmínky, které stanoví, kdy jsou výrazy definovány.

Pravidla pro počítání s mocninami:

Pro každé reálné r, s a každé $a > 0, b > 0$, (respektive pro každé celé r, s a každé $a \neq 0, b \neq 0$) platí:

$$\begin{aligned} a^0 &= 1 & (a^r)^s &= a^{rs} \\ a^{-r} &= \frac{1}{a^r}, & (ab)^r &= a^r \cdot b^r \\ a^r \cdot a^s &= a^{r+s} & \left(\frac{a}{b}\right)^r &= \frac{a^r}{b^r} \\ a^r : a^s &= a^{r-s} & \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} &= \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Pravidla pro počítání s odmocninami:

Nechť $m, n \in \mathbb{N}$, $a \geq 0$. Pak platí:

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{a} &= a^{\frac{1}{n}}. & \text{Pro } a = 0 \text{ je } \sqrt[n]{0} &= 0. \\ & & \text{Pro } n = 1 \text{ je } \sqrt[1]{a} &= a. \\ & & \text{Pro } n = 2 \text{ zapisujeme } \sqrt[2]{a} &= \sqrt{a}. \end{aligned}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \quad a \geq 0 \wedge b \geq 0$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \quad a \geq 0 \wedge b > 0$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}, \quad a \geq 0$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \quad a \geq 0$$

Rozklady nejjednodušších mnohočlenů:

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 \\ (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \\ a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) \\ a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) \\ a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \end{aligned}$$

Rozklad kvadratického trojčlenu na součin kořenových činitelů:

Jsou-li x_1, x_2 kořeny kvadratického trojčlenu $ax^2 + bx + c$, kde $a \neq 0$, pak platí:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Připomínáme **definici absolutní hodnoty**:

Každému reálnému číslu a přiřazujeme právě jedno nezáporné číslo $|a|$ takto:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{pro } a \geq 0 \\ -a & \text{pro } a < 0. \end{cases}$$

Jestliže a, b jsou reálná čísla, pak absolutní hodnota má tyto vlastnosti:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) $ a = \max\{a, -a\}$ | 5) $ ab = a \cdot b $ |
| 2) $ a = -a $ | 6) $ a^n = a ^n$, pro každé přirozené n |
| 3) $a \leq a $ | 7) $\left \frac{a}{b}\right = \frac{ a }{ b }$, pro každé $b \neq 0$ |
| 4) $ a = \sqrt{a^2}$ | 8) $ a + b \leq a + b $, (trojúhelníková nerovnost) |
- 9) Nechtě $\varepsilon > 0$, pak pro libovolná reálná čísla a, x platí:

$$a - \varepsilon < x < a + \varepsilon \iff |x - a| < \varepsilon$$

Příklad 3.1 Upravte výraz V na nejjednodušší tvar:

$$a) V = |-2x|^3 - |(-2x)^2| + |-2x|^2 + \frac{|2x|}{x}, \quad x \neq 0$$

Řešení:

$$\text{Pro } x > 0: \quad V = [-(-2x)]^3 - 4x^2 + [-(-2x)]^2 + \frac{2x}{x} = \underline{\underline{8x^3 + 2}}$$

$$\text{Pro } x < 0: \quad V = (-2x)^3 - 4x^2 + (-2x)^2 + \frac{-2x}{x} = \underline{\underline{-8x^3 - 2}}$$

$$b) V = \frac{x^3 - 3x^2 - x + 3}{x^3 - 2x^2 - 3x}$$

Řešení:

$$V = \frac{x(x^2 - 1) - 3(x^2 - 1)}{x(x^2 - 2x - 3)} = \frac{(x - 1)(x + 1)(x - 3)}{x(x + 1)(x - 3)} = \underline{\underline{\frac{x - 1}{x}}},$$

platí pro $x \neq 0, x \neq -1, x \neq 3$.

$$c) V = \frac{a^2b^{-2} - ab^{-1} + a^{-2}b^2 - a^{-1}b}{(a^{-1} - b^{-1})(ab^{-1} + a^{-1}b + 1)}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} V &= \frac{\frac{a^2}{b^2} - \frac{a}{b} + \frac{b^2}{a^2} - \frac{b}{a}}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1\right)} \cdot \frac{a^2b^2}{a^2b^2} = \frac{a^4 - a^3b + b^4 - ab^3}{(b-a)(a^2 + b^2 + ab)} = \\ &= \frac{a^3(a-b) - b^3(a-b)}{-(a-b)(a^2 + ab + b^2)} = \frac{(a-b)(a^3 - b^3)}{-(a^3 - b^3)} = \underline{\underline{b-a}}, \end{aligned}$$

pro $a \neq 0 \wedge b \neq 0 \wedge a \neq b$.

$$d) V = \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{1 - \sqrt{x^2}}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} &\frac{(x^3 + x^2 - x - 1)(1 - \sqrt{x^2}) + (x^3 - x^2 - x + 1)(1 + \sqrt{x^2})}{1 - x^2} = \\ &= \frac{2x^3 - 2x - 2x^2|x| + 2|x|}{1 - x^2} = 2 \frac{x(x^2 - 1) - |x|(x^2 - 1)}{1 - x^2} = 2(|x| - x); \end{aligned}$$

Pro $x \neq 1 \wedge x \geq 0$: $V = 0$

Pro $x \neq -1 \wedge x < 0$: $V = -2x$

Příklad 3.2 Užitím rozkladu kvadratického trojčlenu převedte na součin:

$$a) x^5 - x^4 - 56x^3 \quad b) x^4 + 2x^2 - 3 \quad c) x^4 - 13x^2 + 40$$

$$[a) x^3(x-8)(x+7); b) (x-1)(x+1)(x^2+3); c) (x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{8})(x-\sqrt{8})]$$

Příklad 3.3 Zjednodušte následující výrazy:

$$a) \frac{x-2y}{x+y} - \frac{2x-y}{y-x} - \frac{2x^2}{x^2-y^2} \quad b) \frac{a^2-x^2}{a+b} \cdot \frac{a^2-b^2}{ax+x^2} \cdot \left(a + \frac{ax}{a-x}\right)$$

$$c) \left(\frac{2x}{x+y} + \frac{y}{x-y} - \frac{y^2}{x^2-y^2}\right) : \left(\frac{1}{x+y} + \frac{x}{x^2-y^2}\right)$$

$$d) \frac{\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 1\right)\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1\right)}{\left(\frac{a^4}{b^2} - \frac{b^4}{a^2}\right)} : (a^2 - b^2)$$

$$e) 1 + \frac{(4-a^2)^{-\frac{1}{2}} - (2-a)^{-\frac{1}{2}}}{(2+a)^{-\frac{1}{2}} + (4-a^2)^{-\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1-a}{1-\sqrt{2-a}}$$

$$f) \left(\frac{x^2+y^2}{x} + y\right) : \left[\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}\right) \cdot \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right]$$

$$g) \left(v + \frac{u-v}{1+uv} \right) : \left(1 - \frac{v(u-v)}{1+uv} \right) \quad h) \frac{\frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1}}{\frac{x+1}{x^2+x+1} + \frac{x-1}{x^2-x+1}} : \frac{x - \frac{x-1}{x+1}}{1 + \frac{x^2-x}{x+1}}$$

$$[a) \frac{x-y}{x+y}, x \neq \pm y; b) \frac{a^2(a-b)}{x}, x \neq 0 \wedge x \neq -a \wedge a \neq -b; c) x, x \neq \pm y \wedge 2x \neq y;$$

$$d) 1, a \neq 0 \wedge b \neq 0 \wedge a \neq \pm b; e) \sqrt{a+2}, a \in (-2; 1) \cup (1; 2);$$

$$f) \frac{xy^2}{x-y}, x \neq y \wedge x \neq 0 \wedge y \neq 0; g) u, uv \neq -1; h) \frac{1}{x^3}, x \neq 0 \wedge x \neq -1]$$

Příklad 3.4 *Usměrňte zlomky:*

$$a) \frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$$

$$b) \frac{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}}$$

$$[a) 5 + 2\sqrt{6}; b) \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}, x > 2]$$

4 Rovnice

4.1 Rovnice lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou, parametrické

Jsou-li $f(x)$ a $g(x)$ funkce proměnné x definované na množině $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$, pak úloha najít všechna $x \in \mathcal{D}$, pro něž $f(x) = g(x)$, znamená řešit rovnici o jedné neznámé.

Lineární rovnici o jedné neznámé $x \in \mathbb{R}$ lze psát ve tvaru

$$ax + b = 0,$$

kde $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Má právě jeden kořen $x = -\frac{b}{a}$.

Graficky tento kořen určíme jako průsečík přímky $y = ax + b$ s osou x .

Příklad 4.1 *V oboru reálných čísel řešte rovnici*

$$\frac{2(x-1)}{11} - \frac{x-3}{2} = 9 - \frac{5(x+1)}{8}.$$

Řešení:

Celou rovnici vynásobíme $8 \cdot 11$, tím se zbavíme zlomků:

$$16(x-1) - 44(x-3) = 792 - 55(x+1)$$

a po roznásobení je:

$$16x - 16 - 44x + 132 = 792 - 55x - 55,$$

sloučíme $-28x + 116 = 737 - 55x$,

k oběma stranám rovnice přičteme $55x - 737$

$$27x - 621 = 0$$

a to je rovnice tvaru $ax + b = 0$. Takže

$$x = \frac{621}{27} = \underline{\underline{23.}}$$

Nemusíme provádět zkoušku, veškeré úpravy (násobení rovnice nenulovým číslem, přičítání stejného čísla k oběma stranám rovnice) jsou ekvivalentní. Zkouška pak má jen charakter kontroly výpočtu.

Příklad 4.2 Řešte v \mathbb{R} rovnici:

$$a) 2 + \frac{3}{x+7} = \frac{x+10}{x+7} \quad b) \frac{3+2x}{2} - \left(\frac{7}{6} - \frac{12x-1}{3}\right) = 5x.$$

Řešení:

a) Řešíme za předpokladu $x + 7 \neq 0$, tzn. $x \neq -7$, úpravou:

$$2(x+7) + 3 = x + 10$$

$$2x + 14 + 3 = x + 10$$

$$x = -7 \quad \text{což je spor} \Rightarrow \underline{\underline{x \in \{ \}}}$$

b) Zbavíme se zlomků

$$3(3+2x) - 7 + 2(12x-1) = 30x$$

$$9 + 6x - 7 + 24x - 2 = 30x$$

$$0 = 0$$

Rovnice má nekonečně mnoho řešení $\underline{\underline{x = t, t \in \mathbb{R}}}$.

Kvadratickou rovnicí o jedné neznámé $x \in \mathbb{R}$ lze psát ve tvaru

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

kde $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Kořeny této rovnice vypočítáme pomocí diskriminantu $D = b^2 - 4ac$.

Pro $D > 0$ dostaneme dva reálné různé kořeny $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

Pro $D = 0$ dostaneme jeden dvojnásobný kořen $x_{1,2} = \frac{-b}{2a}$.

Pro $D < 0$ nemá rovnice v \mathbb{R} řešení.

Graficky kořeny určíme jako průsečíky paraboly $y = ax^2 + bx + c$ s osou x .

Příklad 4.3 Řešte v \mathbb{R} následující kvadratické rovnice:

$$a) x^2 + 4x - 5 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{-4 \pm 6}{2} \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 1}} \vee \underline{\underline{x_2 = -5}}$$

$$b) x^2 - 6x + 9 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = \underline{\underline{3}} \text{ dvojnásobný kořen}$$

$$c) 5x^2 - 4x + 8 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 160}}{10} \text{ v } \mathbb{R} \text{ nemá rovnice řešení}$$

$$d) x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(x + 6) = 0 \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 0}} \vee \underline{\underline{x_2 = -6}}$$

$$e) 5x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (\sqrt{5}x - 2)(\sqrt{5}x + 2) = 0 \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = \frac{2\sqrt{5}}{5}}} \vee \underline{\underline{x_2 = -\frac{2\sqrt{5}}{5}}}$$

$$f) x^2 + 16 = 0 \text{ v } \mathbb{R} \text{ neřešitelná rovnice}$$

Příklad 4.4 Napište kvadratickou rovnici, jejíž kořeny jsou $x_1 = -3\sqrt{3}$ a $x_2 = 2\sqrt{3}$.

Řešení:

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0 \Rightarrow (x + 3\sqrt{3})(x - 2\sqrt{3}) = 0 \Rightarrow \underline{\underline{x^2 + \sqrt{3}x - 18 = 0}}$$

Nebo podle vztahů mezi kořeny x_1, x_2 a koeficienty p, q kvadratické rovnice

$$x^2 + px + q = 0 \quad \text{kde} \quad x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 \cdot x_2 = q$$

pak

$$x^2 + (+3\sqrt{3} - 2\sqrt{3})x - 3\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 0$$

a úpravou dostaneme

$$\underline{\underline{x^2 + \sqrt{3}x - 18 = 0.}}$$

Při řešení **rovníc s absolutní hodnotou** vycházíme z definice absolutní hodnoty a řešíme rovnice v intervalech, které dostaneme pomocí tzv. kritických bodů.

Příklad 4.5 V oboru reálných čísel řešte rovnice s absolutními hodnotami:

$$a) 3 + 4|x - 2| = 5x$$

$$b) |2x - 7| + |x - 2| = 3$$

$$c) 3x - |2x - 1| = x + 1$$

$$d) |3x - 2| + 4 = 2x + 3$$

Řešení:

$$a) \text{ Pro } x \in (-\infty, 2), \text{ rovnice přejde v rovnici } 3 - 4(x - 2) = 5x.$$

Tato má řešení $x = \frac{11}{9}$, které patří do daného intervalu.

$$\text{Pro } x \in \langle 2, \infty \rangle : 3 + 4(x - 2) = 5x \Rightarrow x = -5 \notin \langle 2, \infty \rangle$$

$$\text{Sjednocení řešení pak je } \underline{\underline{x = \frac{11}{9}}}.$$

$$b) x \in (-\infty, 2) : -2x + 7 - x + 2 = 3 \Rightarrow x = 2 \notin (-\infty, 2)$$

$$x \in \langle 2, \frac{7}{2} \rangle : -2x + 7 + x - 2 = 3 \Rightarrow x = 2 \in \langle 2, \frac{7}{2} \rangle$$

$$x \in \langle \frac{7}{2}, \infty \rangle : 2x - 7 + x - 2 = 3 \Rightarrow x = 4 \in \langle \frac{7}{2}, \infty \rangle$$

$$\text{Závěr: } \underline{\underline{x \in \{2, 4\}}}$$

$$c) x \in (-\infty, \frac{1}{2}) : 3x + 2x - 1 = x + 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \notin (-\infty, \frac{1}{2})$$

$$x \in \langle \frac{1}{2}, \infty \rangle : 3x - 2x + 1 = x + 1 \Rightarrow 0 = 0$$

$$\text{Závěr: } \underline{\underline{x \in \langle \frac{1}{2}, \infty \rangle}}$$

$$d) x \in (-\infty, \frac{2}{3}) : -3x + 2 + 4 = 2x + 3 \Rightarrow x = \frac{3}{5} \in (-\infty, \frac{2}{3})$$

$$x \in \langle \frac{2}{3}, \infty \rangle : 3x - 2 + 4 = 2x + 3 \Rightarrow x = 1 \in \langle \frac{2}{3}, \infty \rangle$$

$$\text{Závěr: } \underline{\underline{x \in \{1, \frac{3}{5}\}}}$$

Rovnice s parametrem jsou rovnice, které kromě neznámých obsahují ještě další proměnné - parametry.

Řešení rovnic s parametry spočívá v určení kořenů v závislosti na parametrech a v úplném rozboru všech možností parametrů.

Příklad 4.6 Řešte v \mathbb{R} rovnici $x + 1 - \frac{2x + a + 1}{a} = \frac{a - x}{a}$, kde $a \in \mathbb{R}$ je parametr.

Řešení:

Pro $a = 0$ rovnice nemá smysl.

Pro $a \neq 0$ dostaneme $ax + a - 2x - a - 1 = a - x \Rightarrow$

$$(a - 1)x = a + 1 = \begin{cases} \text{pro } a = 1 : 0 \cdot x = 2, \text{ spor} \\ \text{pro } a \neq 1 : x = \frac{a+1}{a-1} \end{cases}$$

Závěr: $a = 0$ rovnice nemá smysl

$a = 1$ rovnice nemá řešení

$a \neq 0 \wedge a \neq 1$ rovnice má jediné řešení $x = \underline{\underline{\frac{a+1}{a-1}}}$

Příklad 4.7 Pro které hodnoty reálného parametru m má kvadratická rovnice $x^2 + 3x - 2m^2 + m + 3 = 0$ o neznámé $x \in \mathbb{R}$ jeden kořen rovný nule? Najděte druhý kořen.

Řešení:

$$\text{Absolutní člen } -2m^2 + m + 3 = 0 \Rightarrow m_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{-4} \Rightarrow \underline{\underline{m = -1}} \vee \underline{\underline{m = \frac{3}{2}}}.$$

Druhý kořen $x = -3$.**Příklad 4.8** Pro které hodnoty parametru t má kvadratická rovnice $2x^2 + tx + 2 = 0$ reálné různé kořeny?**Řešení:**

$$\text{Reálné různé kořeny} \Rightarrow D = t^2 - 16 > 0 \Rightarrow t^2 > 16 \Rightarrow |t| > 4 \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{t \in (-\infty, -4) \cup (4, \infty)}}$$

Příklad 4.9 Na základě vět o absolutní hodnotě reálného čísla zjistěte, pro která čísla x platí rovnosti:

$$a) |(x-2)(x-4)| = (x-2)(x-4) \quad b) |(x-4)(x-3)| = |x-4||x-3|$$

$$c) |(x-2)(x-5)| = -(x-2)(x-5)$$

$$d) \left| \frac{x-0,5}{x-1,2} \right| = \frac{|x-0,5|}{|x-1,2|} \quad e) \left| \frac{3-x}{x-2} \right| = \frac{3-x}{x-2}$$

$$[a) x \geq 4 \vee x \leq 2 \quad b) \forall x \in \mathbb{R} \quad c) x \in \langle 2, 5 \rangle; \quad d) \forall x \in \mathbb{R} - \{1, 2\} \quad e) x \in (2, 3)]$$

Příklad 4.10 Rozhodněte, který z výroků je pravdivý:

$$a) -2 < x < 2 \iff |x| < 2$$

$$b) -1 \leq x < 3 \iff |x-1| \leq 2$$

$$c) |2x-1| < 3 \iff |x| < 4$$

$$d) x \in \langle -3; 5 \rangle \iff |x| < 5$$

$$[a) \text{ pravdivý; } b) \text{ není pravdivý; } c) \text{ není pravdivý; } d) \text{ není pravdivý}]$$

Příklad 4.11 Řešte v \mathbb{R} rovnici $\frac{1-x}{x-2} - \frac{x-2}{1-x} = -\frac{8}{3}$.

$$[x_1 = \frac{5}{2} \vee x_2 = \frac{5}{4}]$$

Příklad 4.12 Řešte v \mathbb{R} následující rovnice:

$$a) x^2 + 2|x-1| - 6 = 0 \quad b) |2x+1| - |2x| + 1 = 2x$$

$$c) \frac{x+3}{x-3} + \frac{x-1}{x-5} = 4 \quad d) 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

$$e) x^2 - 0,2x + 0,01 = 0 \quad f) 2(1-x)^2 = x-3$$

$$[a) x_1 = 1 - \sqrt{5} \vee x_2 = 2; \quad b) x = 1; \quad c) x_1 = 9 \vee x_2 = 4; \quad d) x_1 = 2 \vee x_2 = -\frac{1}{3};$$

$$e) x_{1,2} = 0, 1 \quad f) x \in \{ \}$$

Příklad 4.13 Řešte v \mathbb{R} rovnici $x - \frac{2}{a^3} = \frac{1}{a^2}(4x + 1)$, parametr $a \in \mathbb{R}$.

$$[a \neq 0; \text{ pro } a = 2 \text{ rovnice nemá řešení;} \\ a = -2 \text{ nekonečně mnoho řešení } x = t, t \in \mathbb{R}; a \neq -2, 0, 2 \text{ je } x = \frac{1}{a(a-2)}]$$

Příklad 4.14 Určete reálnou hodnotu parametru a tak, aby rovnice $6a - ax + 2x = 15$, $x \in \mathbb{R}$ měla kladný kořen.

$$[x = \frac{3(2a-5)}{a-2} > 0, a \in (-\infty, 2) \cup (\frac{5}{2}, \infty)]$$

Příklad 4.15 Pro které reálné hodnoty parametru má rovnice

a) $x^2 - tx + 1 - 2t^2 = 0$ reálné různé kořeny?

b) $x^2 - x + m^2 - m = 12$ jeden kořen roven nule?

$$[a) t \in (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (\frac{2}{3}, \infty); \quad b) m = -3 \vee m = 4; \quad x_1 = 0, x_2 = 1]$$

Příklad 4.16 Najděte kvadratickou rovnici, jejíž kořeny jsou $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 3$.

$$[2x^2 - 7x + 3 = 0]$$

4.2 Rovnice vyššího stupně a iracionální rovnice

Algebraické rovnice vyššího stupně řešíme převodem na součinnový tvar, někdy jako rovnice binomické.

Příklad 4.17 V oboru reálných čísel řešte rovnice:

a) $x^4 = 16$ b) $x^4 + 2x^2 + 1 = 0$

Řešení:

a) $x^4 - 16 = 0$, upravíme na součinnový tvar $(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) = 0 \Rightarrow$ reálné kořeny jsou $x_1 = 2, x_2 = -2$

b) $x^4 + 2x^2 + 1 = 0 \Rightarrow (x^2 + 1)^2 = 0 \Rightarrow$ $x \in \{ \}$

Iracionální rovnice obsahují odmocniny z výrazů s neznámou. Odmocniny odstraňujeme neekvivalentní úpravou - umocněním, proto je nutně součástí řešení zkouška.

Příklad 4.18 V oboru reálných čísel řešte iracionální rovnici:

a) $x - 4 = \sqrt{2x}$ b) $\sqrt{x - 7} - \sqrt{5 - x} = 3$

Řešení:

a) Řešíme za předpokladu $x - 4 \geq 0 \wedge 2x \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$
Umocněním dostaneme

$$(x - 4)^2 = 2x \Rightarrow x^2 - 10x + 16 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 64}}{2} = \frac{10 \pm 6}{2}$$

Podmínce řešitelnosti vyhovuje pouze $x = 8$.

Umocnění je neekvivalentní operace, provedeme zkoušku:

$$\left. \begin{array}{l} L(8) = 8 - 4 = 4 \\ P(8) = \sqrt{16} = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\underline{x = 8}}$$

b) Řešíme za předpokladu $x - 7 \geq 0 \wedge 5 - x \geq 0 \Rightarrow x \in \{\}$

\Rightarrow rovnice nemá řešení.

Příklad 4.19 Řešte v \mathbb{R} iracionální rovnice:

a) $\sqrt{1+x} - \sqrt{4-x} = 1$ b) $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2} = \sqrt{2x+3}$

c) $x - 3\sqrt{x} - 4 = 0$ d) $\sqrt{5+x} + \sqrt{5-x} = 2$

e) $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{3}{2}$

$$[a) x = 3; b) x = \frac{5}{2}; c) x = 16 d) x \in \{\}; e) x = \frac{5}{3}]$$

4.3 Soustavy lineárních rovnic

Několik rovnic o dvou a více neznámých, které mají být současně splněny, tvoří **soustavu rovnic**. Řešením soustavy je průnik řešení jednotlivých rovnic.

Při řešení soustavy se používají **ekvivalentní úpravy soustavy rovnic**, tj. takové úpravy, jimiž se nemění řešení soustavy. V takovém případě není nutná zkouška, ale je vhodná pro kontrolu.

Přehled ekvivalentních úprav soustavy rovnic:

Nahrazení libovolné rovnice soustavy rovnicí, která je s ní ekvivalentní, tj. má totéž řešení.

Nahrazení libovolné rovnice soustavy součtem této rovnice a libovolné jiné rovnice soustavy.

Dosažení neznámé nebo výrazu s neznámou z jedné rovnice soustavy do jiné její rovnice.

My se budeme zabývat **soustavou lineárních rovnic**. Základním typem metod řešení lineárních algebraických rovnic jsou eliminační metody, jejichž podstatou je postupná eliminace (vylučování) neznámých z rovnic soustavy. Podle způsobu, jímž eliminujeme jednu neznámou, rozlišujeme několik metod řešení:

Metoda sčítací - rovnice soustavy násobíme čísly zvolenými tak, aby se po sečtení vynásobených rovnic jedna neznámá vyloučila.

Příklad 4.20 Metodou sčítací řešte v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic.

$$\begin{aligned} 2x - y &= 1 \\ x + 3y &= 11. \end{aligned}$$

Řešení:

První rovnici vynásobíme třemi, dostáváme rovnici $6x - 3y = 3$. Získali jsme tímto způsobem ekvivalentní soustavu

$$\begin{aligned} 6x - 3y &= 3 \\ x + 3y &= 11. \end{aligned}$$

Rovnice teď sečteme, tím vyloučíme neznámou y a pro neznámou x dostáváme rovnici

$$7x = 14, \quad x = 2.$$

Obdobně lze vyloučit neznámou x vynásobením druhé rovnice minus dvěma a sečtením s první rovnicí. Dostáváme rovnici

$$-7y = -21, \quad y = 3.$$

Řešením soustavy je uspořádaná dvojice $[x, y]$, $x = 2, y = 3$.

Metoda dosazovací - vyjádříme jednu neznámou z jedné rovnice soustavy a dosadíme ji do dalších rovnic, čímž se jedna neznámá ze soustavy vyloučí.

Příklad 4.21 Metodou dosazovací řešte v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic.

$$\begin{aligned} 2x - y &= 5 \\ 3x + 4y &= -9. \end{aligned}$$

Řešení:

Z první rovnice vyjádříme $y = 2x - 5$, a dosadíme do druhé rovnice. Dostáváme

$$3x + 4(2x - 5) = -9, \quad 11x = -9 + 20, \quad x = 1.$$

Potom $y = 2x - 5 = 2 - 5 = -3$. Dostali jsme řešení $x = 1, y = -3$.

Metodu sčítací a dosazovací můžeme také kombinovat.

Příklad 4.22 V $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ řešte soustavy rovnic:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } x + y = 4 & \text{b) } 14x + 4y = 13 & \text{c) } 2x - 3y = 5 \\ 2x + 3y = 7 & 7x + 2y = 12 & 4x - 6y = 10 \end{array}$$

Řešení:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } x + y = 4 & / \cdot (-3) & \Rightarrow -3x - 3y = -12 \\ 2x + 3y = 7 & & \Rightarrow 2x + 3y = 7 \end{array} \Rightarrow \underline{\underline{x = 5, y = -1}}$$

$$\begin{array}{l} b) \quad 14x + 4y = 13 \\ \quad \quad 7x + 2y = 12 \quad / \cdot 2 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} 14x + 4y = 13 \\ 14x + 4y = 24 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{\text{soustava nemá} \\ \underline{\underline{\text{řešení}}}}}$$

$$\begin{array}{l} c) \quad 2x - 3y = 5 \quad / \cdot 2 \\ \quad \quad 4x - 6y = 10 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} 4x - 6y = 10 \\ 4x - 6y = 10 \end{array}$$

$$\Rightarrow \quad \text{soustava má nekonečně mnoho řešení} \quad \underline{\underline{x = t, y = \frac{1}{3}(2t - 5), t \in \mathbb{R}}}$$

Při řešení více než dvou rovnic je nejvýhodnější použití **Gaussovy eliminační metody**, která spočívá v postupném převedení dané soustavy rovnic ekvivalentními úpravami na tzv. trojúhelníkový tvar.

Příklad 4.23 *Užitím Gaussovy eliminační metody řešte v $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic.*

$$9x + 5y - 2z = 15 \quad (1)$$

$$8x + 6y + 3z = 15 \quad (2)$$

$$3x - 7y + 4z = 27 \quad (3)$$

Řešení:

Nejprve soustavu upravíme tak aby v první rovnici koeficient u neznámé x byl 1. Bylo by možné toho dosáhnout dělením první rovnice číslem 9, tím bychom ovšem dostali v první rovnici desetinná čísla. Raději od první rovnice odečteme druhou, čímž dostaneme soustavu rovnic:

$$x - y - 5z = 0 \quad (1)$$

$$8x + 6y + 3z = 15 \quad (2)$$

$$3x - 7y + 4z = 27 \quad (3)$$

Dále v získané soustavě od druhé rovnice odečteme 8-krát první, a od třetí rovnice odečteme 3-krát první. Tím eliminujeme neznámou x v těchto rovnicích a dostáváme tuto ekvivalentní soustavu:

$$x - y - 5z = 0 \quad (1)$$

$$14y + 43z = 15 \quad (2)$$

$$-4y + 19z = 27 \quad (3)$$

Nyní druhou rovnici dělíme čtrnácti, abychom u neznámé y získali koeficient 1. Dále k třetí rovnici přičteme 4-krát druhou, čímž v ní eliminujeme neznámou y . Tím přecházíme k této soustavě rovnic:

$$x - y - 5z = 0 \quad (1)$$

$$y + \frac{43}{14}z = \frac{15}{14} \quad (2)$$

$$219z = 219 \quad (3)$$

Tato soustava má trojúhelníkový tvar a její řešení určíme snadno takto: Z třetí rovnice po

dělení číslem 219 dostáváme: $z = 1$. Dosazením do druhé rovnice vypočteme

$$y = \frac{1}{14}(15 - 43) = -2$$

a po dosazení do první rovnice vychází $x = -2 + 5 = 3$.

Dostali jsme řešení $x = 3, y = -2, z = 1$.

Příklad 4.24 V \mathbb{R}^3 řešte soustavy rovnic:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } x + 2y + 3z = 7 & \text{b) } x + 2y + 3z = 1 & \text{c) } x + 2y + 3z = 1 \\ 3x - y + z = 6 & x + 3y + 5z = 2 & 2x + 4y + 6z = 2 \\ x + y + z = 4 & 2x + 5y + 8z = 12 & x - y + z = 4 \end{array}$$

Řešení:

Soustavy budeme řešit Gaussovou eliminační metodou.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } x + 2y + 3z = 7 & x + 2y + 3z = 7 & x + 2y + 3z = 7 \\ 3x - y + z = 6 & \Rightarrow -7y - 8z = -15 & \Rightarrow y + 2z = 3 \\ x + y + z = 4 & y + 2z = 3 & 6z = 6 \end{array}$$

Tato soustava má trojúhelníkový tvar a můžeme jej snadno vyřešit.

Postupně dostáváme $z = 1, y = 3 - 2z = 1, x = 7 - 2y - 3z = 7 - 2 - 3 = 2$.

Dostali jsme tedy řešení $x = 2, y = 1, z = 1$.

$$\begin{array}{lll} \text{b) } x + 2y + 3z = 1 & x + 2y + 3z = 1 & x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 5z = 2 & \Rightarrow y + 2z = 1 & \Rightarrow y + 2z = 1 \\ 2x + 5y + 8z = 12 & y + 2z = 10 & 0 = 9 \end{array}$$

Z trojúhelníkového tvaru vidíme, že soustava nemá řešení.

$$\begin{array}{lll} \text{c) } x + 2y + 3z = 1 & x + 2y + 3z = 1 & x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 4y + 6z = 2 & \Rightarrow 0 = 0 & \Rightarrow 3y + 2z = -3 \\ x - y + z = 4 & 3y + 2z = -3 & \end{array}$$

\Rightarrow soustava má nekonečně mnoho řešení.

Zvolíme-li $z = t$, pak postupně máme

$$y = -\frac{2}{3}t - 1 \text{ a } x = 1 + \frac{4}{3}t + 2 - 3t = 3 - \frac{5}{3}t.$$

Řešením soustavy potom bude uspořádaná trojice $x = 3 - \frac{5}{3}t, y = -1 - \frac{2}{3}t, z = t, t \in \mathbb{R}$.

Příklad 4.25 Řešte v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavy lineárních rovnic:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 8x - 3y + 12 = 0 & \text{b) } 2x - 6y = -2 & \text{c) } x + 2y = 4 \\ 3x + 2y - 33 = 0 & x - 3y = 4 & 2x + 4y = 8 \end{array}$$

[a) $x = 3, y = 12$; b) nemá řešení; c) $x = 4 - 2a, y = a, a \in \mathbb{R}$]

Příklad 4.26 Převedením na trojúhelníkový tvar řešte v \mathbb{R}^3 soustavu rovnic:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 2x - 3y + 4z = 8 & \text{b) } x + 4y - 3z = 0 & \text{c) } x + 2y + 4z = 31 \\ 3x + 5y - z = 10 & x - 3y - z = 0 & 5x + y + 2z = 29 \\ 7x - y + 7z = 15 & 2x + y - 4z = 0 & 3x - y + z = 10 \end{array}$$

[a) nemá řešení; b) $x = 13t/7, y = 2t/7, z = t$; c) $x = 3, y = 4, z = 5$]

Příklad 4.27 Převedením na trojúhelníkový tvar řešte v \mathbb{R}^4 soustavu rovnic:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 2x - 3y + 6z - u = 1 & \text{b) } x + 2y - z - 2u = -2 \\ x + 2y - z = 0 & 2x + y + z + u = 8 \\ x + 3y - z - u = -2 & x - y - z + u = 1 \\ 9x - y + 15z - 5u = 1 & x + 2y + 2z - u = 4 \end{array}$$

[a) soustava nemá řešení; b) $x = 1, y = 2, z = 1, u = 3$]

Příklad 4.28 Určete vzájemnou polohu tří rovin:

$$\begin{array}{l} \alpha : 2x - 3y + z = 0 \\ \beta : x + 2y - z - 3 = 0 \\ \gamma : 2x + y + z - 12 = 0 \end{array}$$

[roviny se protínají v bodě $[2, 3, 5]$]

Příklad 4.29 Užitím Gaussovy eliminační metody řešte v \mathbb{R}^3 soustavu rovnic v závislosti na parametru a .

$$\begin{array}{l} 2x + 9y + 2z = 7a - 4 \\ 3x + 3y + 4z = 3a - 6 \\ 4x - 6y + 2z = -a - 8 \end{array}$$

$[x, y, z] = [a - 2, 2a/3, -a/2]$

5 Řešení nerovnic

5.1 Operace s nerovnicemi

Jsou-li f a g funkce proměnné x definované na množině $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$, pak úloha: "najděte všechna $x \in \mathcal{D}$, která po dosazení do jednoho ze vztahů:

$$f(x) < g(x), f(x) > g(x), f(x) \leq g(x), f(x) \geq g(x)$$

dají pravdivou nerovnost" znamená řešit nerovnici s neznámou x .

Při řešení nerovnic používáme ekvivalentní úpravy:

1. Záměna stran nerovnice se současnou změnou znaku nerovnice:

$$f(x) < g(x) \Leftrightarrow g(x) > f(x)$$

2. Přičtení konstanty nebo funkce $h(x)$, definované v \mathcal{D} , k oběma stranám nerovnice:

$$f(x) < g(x) \Leftrightarrow f(x) + h(x) < g(x) + h(x)$$

3. Násobení nenulovou konstantou nebo funkcí $h(x)$ definovanou v \mathcal{D} :

$$a) h(x) > 0 \text{ pro } x \in \mathcal{D} : f(x) < g(x) \Leftrightarrow f(x)h(x) < g(x)h(x)$$

$$b) h(x) < 0 \text{ pro } x \in \mathcal{D} : f(x) < g(x) \Leftrightarrow f(x)h(x) > g(x)h(x)$$

4. Umocnění pro případ nezáporných stran nerovnice:

$$0 \leq f(x) < g(x) \Leftrightarrow f^n(x) < g^n(x), n \in \mathbb{N}$$

5. Odmocnění pro případ nezáporných stran nerovnice:

$$0 \leq f(x) < g(x) \Leftrightarrow \sqrt[n]{f(x)} < \sqrt[n]{g(x)}, n \in \mathbb{N}$$

Pokud používáme při řešení nerovnic ekvivalentní úpravy, není potřeba provádět zkoušku, snad jen pro vyloučení vlastních chyb.

Klasifikace nerovnic

Elementární nerovnice s neznámou x můžeme rozdělit (podobně jako rovnice) podle toho, v jaké pozici se v dané nerovnici nachází neznámá. Rozlišujeme nerovnice lineární a kvadratické, nerovnice s absolutní hodnotou, exponenciální a logaritmické nerovnice, iracionální nerovnice.

Postup řešení pro jednotlivé typy nerovnic ukážeme na příkladech.

5.2 Lineární nerovnice

Příklad 5.1 Řešte v \mathbb{R} nerovnici

$$\frac{2x - 17}{4} - \frac{8 - x}{2} - 2 \leq x - 4 + \frac{x}{8}.$$

Řešení:

Odstraníme zlomky a upravíme roznásobením.

$$\begin{aligned} 2(2x - 17) - 4(8 - x) - 16 &\leq 8(x - 4) + x \\ 4x - 34 - 32 + 4x - 16 &\leq 8x - 32 + x \\ 4x + 4x - 8x - x &\leq -32 + 34 + 32 + 16 \\ -x &\leq 50 \quad \cdot (-1) \\ x &\geq -50 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{x \in \langle -50; \infty \rangle}} \end{aligned}$$

Příklad 5.2 Řešte v \mathbb{N} nerovnici

$$\frac{3x - 1}{4} - \frac{5 - 6x}{2} - 2 \leq 8 + \frac{3x}{2}.$$

Řešení:

Odstraníme zlomky a upravíme roznásobením, stejně jako když hledáme řešení nerovnice v \mathbb{R} .

$$\begin{aligned} \frac{3x - 1}{4} - \frac{5 - 6x}{2} - 2 &\leq 8 + \frac{3x}{2} \quad \cdot 4 \\ 3x - 1 - 2(5 - 6x) &\leq 32 + 2 \cdot 3x \\ 3x - 1 - 10 + 12x &\leq 32 + 6x \\ 3x + 12x - 6x &\leq 32 + 1 + 10 \\ 9x &\leq 43 \\ x &\leq \frac{43}{9} \quad \wedge \quad x \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Hledáme řešení v oboru přirozených čísel. Dostaneme

$$\underline{\underline{x \in \{1, 2, 3, 4\}}}$$

Příklad 5.3 Řešte v \mathbb{R} nerovnici v podílovém tvaru $\frac{12 - x}{x - 4} > 0$.

Řešení:

$$\frac{12-x}{x-4} > 0 \Leftrightarrow [(12-x) > 0 \wedge (x-4) > 0] \vee [(12-x) < 0 \wedge (x-4) < 0]$$

$$[x < 12 \wedge x > 4] \vee [x > 12 \wedge x < 4]$$

$$4 < x < 12 \vee x \in \{ \}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x \in (4; 12)}}$$

Jiný způsob řešení:

Najdeme tzv. nulové body čitatele a jmenovatele - to jsou body, ve kterých je polynom v čitateli nebo ve jmenovateli rovný nule - a v intervalech mezi nulovými body zjistíme znaménko čitatele, jmenovatele a nakonec celého zlomku.

	$(-\infty; 4)$	$(4; 12)$	$(12; \infty)$
$12 - x$	+	+	-
$x - 4$	-	+	+
podíl	-	+	-

Máme ostrou nerovnost, takže řešením naší nerovnice je $x \in \underline{\underline{(4; 12)}}$.

Příklad 5.4 Řešte v \mathbb{R} nerovnici $\frac{2-x}{4+x} \leq 1$.

Řešení:

Upravíme na podílový tvar:

$$\frac{2-x-4-x}{4+x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-2(x+1)}{4+x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x+1}{4+x} \geq 0.$$

Můžeme využít nulových bodů čitatele a jmenovatele, pak dostaneme řešení

$$\underline{\underline{x \in (-\infty; -4) \cup \langle -1; \infty \rangle}}$$

Danou rovnici můžeme řešit i jinak:

$$\frac{2-x}{4+x} \leq 1 \setminus \cdot (4+x)$$

$$a) 4+x > 0 \Rightarrow 2-x \leq 4+x \Rightarrow -2 \leq 2x \Rightarrow x \geq -1$$

Dostali jsme, že

$$(x > -4 \wedge x \geq -1) \Rightarrow x \geq -1.$$

$$b) 4+x < 0 \Rightarrow 2-x \geq 4+x \Rightarrow x \leq -1$$

Dostali jsme, že

$$(x < -4 \wedge x \leq -1) \Rightarrow x < -4.$$

Tedy $x < -4 \vee x \geq -1$ čili $\underline{\underline{x \in (-\infty; -4) \cup \langle -1; \infty \rangle}}$.

5.3 Kvadratická nerovnice

Příklad 5.5 Řešte v \mathbb{R} nerovnici $x^2 - 4x - 5 \geq 0$.

Řešení:

$$x^2 - 4x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 5)(x + 1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow [(x - 5) \geq 0 \wedge (x + 1) \geq 0] \vee [(x - 5) \leq 0 \wedge (x + 1) \leq 0]$$

$$x \geq 5 \vee x \leq -1 \Rightarrow \underline{\underline{x \in (-\infty; -1] \cup [5; \infty)}}$$

Úlohu můžeme řešit i pomocí nulových bodů

polynomu nebo také graficky:

$y = x^2 - 4x - 5$ je rovnice paraboly,

její vrcholový tvar je $y + 9 = (x - 2)^2$,

vrchol je $V[2; -9]$, průsečíky s osou x :


$$P_1[-1; 0] \quad P_2[5; 0],$$

$$\text{protože } (x - 2)^2 = 9 \Leftrightarrow x - 2 = \pm 3$$

$$\Rightarrow x_1 = 5, x_2 = -1.$$

Načrtneme graf.

Vidíme, že $y \geq 0$ pro $\underline{\underline{x \in (-\infty; -1] \cup [5; \infty)}}$.



Příklad 5.6 Řešte v \mathbb{R} nerovnici $\frac{x+3}{x-1} + \frac{x+4}{x-4} \geq 2$.

Řešení:

Převědeme na podílový tvar $\frac{(x+3)(x-4) + (x+4)(x-1) - 2(x-1)(x-4)}{(x-1)(x-4)} \geq 0$ a po

úpravě čitatele $\frac{12(x-2)}{(x-1)(x-4)} \geq 0$.

Pomocí nulových bodů:

	$(-\infty; 1)$	$(1; 2)$	$(2; 4)$	$(4; \infty)$
$x - 1$	-	+	+	+
$x - 2$	-	-	+	+
$x - 4$	-	-	-	+
zlomek	-	+	-	+

$$\underline{\underline{x \in (1; 2) \cup (4; \infty)}}$$

5.4 Nerovnice s absolutními hodnotami

Příklad 5.7 Řešte v \mathbb{R} nerovnici $|12 - x| > 15 - |x + 3|$.

Řešení:

Pomocí nulových bodů výrazů v absolutních hodnotách rozdělíme \mathbb{R} na intervaly, ve kterých nerovnice řešíme.

$$\text{Pro } x \in (-\infty; -3) : \underbrace{12 - x > 15 + (x + 3)}_{x < -3} \Rightarrow x < -3.$$

$$\text{Pro } x \in (-3; 12) : \underbrace{12 - x > 15 - (x + 3)}_{x \in \{ \}} \Rightarrow 12 < 12.$$

$$\text{Pro } x \in (12; \infty) : \underbrace{-12 + x > 15 - (x + 3)}_{x > 12} \Rightarrow x > 12.$$

Celé řešení rovnice $x \in (-\infty; -3) \cup (12; \infty)$.

5.5 Iracionální nerovnice a soustavy nerovnic

Příklad 5.8 Řešte v \mathbb{R} nerovnici $\sqrt{x - 3} < 5$.

Řešení:

Nerovnice má smysl pouze pro $x - 3 \geq 0$ t.j. $x \geq 3$, potom na obou stranách nerovnice jsou nezáporná čísla a lze umocnit:

$$x - 3 < 25 \Rightarrow x < 28.$$

Řešení je pak $x \in \langle 3; 28 \rangle$.

Příklad 5.9 Řešte v \mathbb{R} nerovnici $x + 1 < \sqrt{6x - 14}$.

Řešení:

Řešíme za předpokladu $6x - 14 \geq 0 \wedge x + 1 \geq 0$, tedy $x \geq \frac{7}{3}$.

Po umocnění $x^2 + 2x + 1 < 6x - 14 \Rightarrow x^2 - 4x + 15 < 0$.

Kvadratický trojčlen $x^2 - 4x + 15$ má komplexní kořeny ($D < 0$).

Parabola $y = x^2 - 4x + 15$ nikde neprotne osu x , proto řešení je $x \in \{ \}$.

Příklad 5.10 Řešte v \mathbb{R} soustavu nerovnic

$$\frac{1}{x+1} > 0 \wedge x^3 - x^2 < 0.$$

Řešení:

Ekvivalentní soustava je $x + 1 > 0 \wedge x^2(x - 1) < 0$.

Na znaménko polynomu nemají vliv kořeny se sudou násobností.

Tedy $x \in \underline{\underline{(-1; 0) \cup (0; 1)}}$.

Příklad 5.11 Která přirozená čísla splňují nerovnici $\frac{3}{2}x - \frac{2x+6}{3} > \frac{4x-2}{5}$.

$$[x \in \{49, 50, 51, \dots\}]$$

Příklad 5.12 Řešte v \mathbb{R} nerovnice:

$$a) \frac{1-3x}{x+4} < 2 \quad b) \frac{x+2}{1-x} \leq -2 \quad c) \frac{3x-1}{x+1} < 2 \quad d) \frac{x^2+x}{x^2+1} \leq 1$$

$$[a) (-\infty; -4) \cup (-\frac{7}{5}; \infty); b) (1; 4); c) (-1; 3); d) (-\infty; 1)]$$

Příklad 5.13 V množině celých záporných čísel řešte nerovnici

$$\frac{x+3}{2} - \frac{x-2}{3} - 5 > \frac{x-1}{2}.$$

$$[x \in \{-8, -9, -10, \dots\}]$$

Příklad 5.14 Jaké musí být číslo k , aby rovnice $5kx - 9 = 10x - 3k$ měla kladné řešení?

$$[2 < k < 3]$$

Příklad 5.15 Řešte v \mathbb{R} kvadratické nerovnice:

$$a) 2x^2 - 3x - 2 > 0 \quad b) 20x - x^2 \geq 36$$

$$c) x^2 + x + 1 < 0 \quad d) x^2 - 0,2x + 0,01 \leq 0$$

$$[a) x \in (-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (2; \infty); b) x \in (2; 18); c) x \in \{ \}; d) x = 0,1]$$

Příklad 5.16 Pro která $m \in \mathbb{R}$ bude platit $x^2 + 6x + (5m - 1)(m - 1) > 0$ pro všechna reálná x ?

$$[m \in (-\infty; -\frac{4}{5}) \cup (2; \infty)]$$

Příklad 5.17 Řešte v \mathbb{R} nerovnice:

$$a) \frac{x+2}{x+3} - \frac{2x-1}{3x+1} \geq 0 \quad b) x(x^2 - 7x + 10) > 0$$

$$c) \frac{x^2 - 9x + 18}{x^2 - x - 2} < 0 \quad d) \frac{x^4}{x+2} + \frac{x^4}{3-x} < \frac{(10x-6)x^2}{-x^2+x+6}$$

$$[a) x \in (-\infty; -3) \cup (-\frac{1}{3}; \infty); b) x \in (0; 2) \cup (5; \infty);$$

$$c) x \in (-1; 2) \cup (3; 6); d) x \in (-\infty; -2) \cup (3; \infty)]$$

Příklad 5.18 V oboru reálných čísel řešte nerovnice:

$$a) |x-3| > 5 \quad b) |x+2| < 8$$

$$[a) x \in (-\infty; -2) \cup (8; \infty); b) x \in (-10; 6)]$$

Příklad 5.19 Pomocí absolutní hodnoty запиšte nerovnice:

$$a) -2 < x < 2 \quad b) 1 \leq x \leq 3 \quad c) -3 \leq x \leq -1$$

$$[a) |x| < 2; b) |x-2| \leq 1; c) |x+2| \leq 1]$$

Příklad 5.20 Najděte množinu všech řešení nerovnic s absolutní hodnotou:

$$a) |x| + \frac{1}{x} < 0 \quad b) \frac{|x|}{x} - 1 < 0$$

$$c) |x+1| + |x| \leq 2 \quad d) 1 - |x| \leq |x+1|$$

$$e) \frac{|2x-2|}{2-x} < 1 \quad f) |x| \leq |x-1|$$

$$g) |3x+1| < 2x \quad h) |x+2| - 2|2x+4| \leq |3x-1|$$

$$i) |x-3| \cdot |x-2| \cdot |x+4| > 0$$

$$[a) x \in (-1; 0); b) x \in (-\infty; 0); c) x \in \langle -\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \rangle; d) x \in \mathbb{R}; e) x \in (0; \frac{4}{3}) \cup (2; \infty);$$

$$f) x \in (-\infty; \frac{1}{2}); g) x \in \emptyset; h) x \in \mathbb{R}; i) x \in \mathbb{R}, x \neq -4, 2, 3]$$

Příklad 5.21 Řešte v \mathbb{R} iracionální nerovnice:

$$a) \sqrt{x^2 + x - 12} \leq 6 - x \quad b) x - 3\sqrt{x} - 4 \geq 0$$

$$c) \sqrt{x+2} < \sqrt{2x-8} \quad d) \sqrt{x-2} + x > 4$$

$$e) \sqrt{-x^2 + 8x - 12} > \sqrt{3}$$

$$[a) x \in (-\infty; -4) \cup \langle 3; \frac{48}{13} \rangle; b) x \in \langle 16; \infty \rangle; c) x \in (10; \infty);$$

$$d) x \in (3; \infty); e) x \in (3; 5)]$$

Příklad 5.22 Řešte v \mathbb{R} soustavu nerovnic

$$x^2 - 4x - 5 < 0 \quad \wedge \quad x^2 - 8x + 15 < 0.$$

$$[x \in (3; 5)]$$

Příklad 5.23 Najděte $x \in \mathbb{R}$, která splňují složenou nerovnost.

$$a) \frac{x}{2} - 1 < |x| < \frac{x}{2} + 1 \quad b) |3x - 1| < x < |3x + 1|$$

$$[a) -\frac{2}{3} < x < 2; b) \frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}]$$

Příklad 5.24 Najděte zlomek, pro nějž platí:

zmenšíme-li jmenovatele o 1, je zlomek roven $\frac{1}{2}$, zvětšíme-li čitatele o 20, dostaneme zlomek z intervalu $(2;3)$.

$$[\frac{4}{9}, \frac{5}{11}]$$

6 Elementární funkce

6.1 Lineární funkce

Lineární funkcí nazýváme každou funkci f , která je daná předpisem

$$f : y = kx + q, \quad k, q \in \mathbb{R}.$$


Grafem lineární funkce je vždy přímka různoběžná s osou O_y .

Definiční obor \mathcal{D} lineární funkce f (značíme \mathcal{D}_f) je \mathbb{R} .

Obor hodnot funkce f pro $k \neq 0$ (značíme \mathcal{H}_f) je \mathbb{R} .

Význam konstant k, q je vidět z následujícího obrázku:

Pro $k = 0$ dostáváme **konstantní funkci**.



$k > 0$
 $k = \operatorname{tg} \alpha, \alpha < \frac{\pi}{2}$
 rostoucí funkce

$k < 0,$
 $k = \operatorname{tg} \alpha, \alpha > \frac{\pi}{2}$
 klesající funkce

$k = 0$
 $k = \operatorname{tg} \alpha, \alpha = 0$
 konstantní funkce

Příklad 6.1 Určete lineární funkci, jejímiž prvky jsou uspořádané dvojice $[-2; -3], [-1; -4]$ a jejíž obor funkčních hodnot je interval $\langle -6; 0 \rangle$.

Sestrojte graf.

Řešení:

Je $y = kx + q$ a dosadíme souřadnice bodů.

Pak $-3 = -2k + q \wedge -4 = -k + q$.


Řešením této soustavy dostaneme

$k = -1, q = -5$.

Lineární funkce pak je

$$\underline{\underline{y = -x - 5.}}$$

Pro $y \in \langle -6; 0 \rangle$ dostaneme krajní body úsečky $[1; -6], [-5; 0]$.



Příklad 6.2 Nakreslete grafy těchto funkcí:

a) $f_1 : y = -x + 3$

Funkce je definována pro každé $x \in \mathbb{R}$, grafem lineární závislosti je přímka.

$$H(f_1) = \mathbb{R}$$


$$\text{Zvolíme } x_1 = 0 \Rightarrow y_1 = 3, \text{ dále } y_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 3.$$

Tyto průsečíky se souřadnicovými osami nám určí přímku.


b) $f_2 : y = 2x + 1$ pro $x \in \langle -0,5; 2 \rangle$

Příslušná úsečka má krajní body $[-\frac{1}{2}; 0]$ a $[2; 5]$

$$D(f_2) = \langle -0,5; 2 \rangle, \quad H(f_2) = \langle 0; 5 \rangle$$



$$f_1 : y = -x + 3$$




$$f_2 : y = 2x + 1$$

Příklad 6.3 Nakreslete graf funkce $y = |x| - 2|x - 1| + |x - 2|$.

Řešení:

Body $x = 0, 1, 2$ rozdělí osu x na čtyři intervaly a určíme tvar funkce y v jednotlivých intervalech:

	$(-\infty; 0)$	$(0; 1)$	$(1; 2)$	$(2; \infty)$
$ x $	$-x$	x	x	x
$-2 x-1 $	$-2(-x+1)$	$-2(-x+1)$	$-2(x-1)$	$-2(x-1)$
$ x-2 $	$-x+2$	$-x+2$	$-x+2$	$x-2$
y	0	$2x$	$-2x+4$	0



$$y = |x| - 2|x - 1| + |x - 2|$$


6.2 Kvadratická funkce

Kvadratickou funkcí nazýváme každou funkci, která je daná předpisem


$$f : y = ax^2 + bx + c, \text{ kde } a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0.$$

Definiční obor kvadratické funkce f je $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

Grafem kvadratické funkce je parabola s osou rovnoběžnou s osou y .



$$f : y = ax^2 + bx + c, a < 0$$



$$f : y = ax^2 + bx + c, a > 0$$

Máme-li sestrojit graf kvadratické funkce

$$y = ax^2 + bx + c,$$


vyjdeme ze základní paraboly $y = x^2$ a postupnými transformacemi určíme souřadnice vrcholu. Je také vhodné určit průsečíky s osami.

Příklad 6.4 Načrtněte graf kvadratické funkce $y = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{9}{4}$.


Řešení:

Předpis upravíme na tvar $y + 3 = \frac{3}{4}(x + 1)^2$ a postupně sestrojíme


$$y_1 = x^2, \quad y_2 = (x + 1)^2, \quad y_3 = \frac{3}{4}(x + 1)^2, \quad y = \frac{3}{4}(x + 1)^2 - 3 \text{ neboli } y - 3 = \frac{3}{4}(x + 1)^2.$$




$$y_1 = x^2$$



$$y_2 = (x + 1)^2$$



$$y_3 = \frac{3}{4}(x + 1)^2$$



$$y + 3 = \frac{3}{4}(x + 1)^2$$

Obecně tedy:

Rovnoběžným posunutím paraboly $y = ax^2$ do vrcholu $V(m; n)$ dostaneme parabolu

$$y - n = a(x - m)^2.$$

Osa paraboly zůstává rovnoběžná s osou y .

6.3 Mocninná funkce

Mocninná funkce s přirozeným exponentem je funkce

$$f : y = x^n, \quad n \in \mathbb{N}, n > 2.$$

Definiční obor mocninné funkce je $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Příklad 6.5 *Načrtněte grafy funkcí*

$$f_1 : y = x^3 - 1, \quad f_2 : y = (x - 1)^3, \quad f_3 : y = \frac{1}{4}x^4, \quad f_4 : y = |x^4 - 3|.$$

Řešení:


Upravíme analogicky jako u kvadratické funkce:

$$f_1 : y + 1 = x^3, \text{ graf dostaneme posunutím grafu funkce } y = x^3 \text{ do vrcholu } V[0; -1].$$


$$f_2 : y + 0 = (x - 1)^3, \quad V[1; 0]$$

$$f_3 : y + 0 = \frac{1}{4}(x + 0)^4, \quad V[0; 0]$$


$$f_4 : \text{Nakreslíme postupně grafy } y_1 + 3 = x^4 \text{ a pak } y = |y_1|.$$




$$f_1 : y + 1 = x^3$$



$$f_2 : y + 0 = (x - 1)^3$$



$$f_3 : y = \frac{1}{4}x^4$$



$$f_4 : y = |x^4 - 3|$$

Příklad 6.6 Bez výpočtu rozhodněte, které z čísel 4^{300} , 3^{400} je větší.

Řešení:


Upravíme $4^{300} = (4^3)^{100}$, $3^{400} = (3^4)^{100}$.

Obě mocniny lze chápat jako hodnoty funkce $y = x^{100}$.

Tato funkce je pro $x \in \langle 0 : \infty \rangle$ rostoucí, $4^3 < 3^4$, proto $4^{300} < 3^{400}$.

Příklad 6.7 Uvažujme množinu všech kvádrů, jejichž délky hran jsou v poměru $1 : 2 : 3$. Určete funkci vyjadřující závislost objemu kvádru na délce jeho nejdelší hrany a načrtněte její graf.

Řešení:



Označme délku nejdelší hrany b ,

pak $a = \frac{b}{3}$; $c = \frac{2}{3}b$ pro $b > 0$.

Pak $V = \underline{\underline{\frac{2}{9}b^3}}$.

Příklad 6.8 Určete definiční obor funkcí:

$$a) y = \sqrt{2x - 6} \quad b) y = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}}$$

Řešení:

a) Aby byla funkce $y = \sqrt{2x - 6}$ definovaná, musí být $2x - 6 \geq 0$, tedy $x \geq 3$.

Můžeme tedy psát, že

$$\underline{\underline{D(f) = \langle 3, \infty \rangle}}$$

b) Definičním oborem funkce bude řešení nerovnice $\frac{x - 1}{x + 1} \geq 0$, $x \neq -1$

Nulové body čitatele a jmenovatele jsou $x = -1$ a $x = 1$.

Dostaneme

$$\underline{\underline{D(f) = (-\infty, -1) \cup \langle 1, \infty \rangle}}$$



Mocninná funkce s celým záporným exponentem je funkce

$$f : y = x^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Definiční obor této funkce $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} - \{0\}$.

Příklad 6.9 Nakreslete grafy funkcí $f_1 : y = \frac{1}{x}$ a $f_2 : y = \frac{1}{x^2}$.

Řešení:



Lineární lomená funkce je funkce daná předpisem

$$f : y = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad \text{kde } a, b, c, d \in \mathbb{R}, x \neq -\frac{d}{c}, c \neq 0.$$

Definiční obor této funkce je $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\}$.

Nejjednodušší případ nastane pro $a = d = 0$, pak $y = \frac{k}{x}$ a grafem je **rovnoosá hyperbola**.


V případě, kdy $ad - cb \neq 0$ dostaneme po úpravě

$$y - \frac{a}{c} = \frac{a}{c} \cdot \frac{\frac{b}{a} - \frac{d}{c}}{x + \frac{d}{c}}$$


opět rovnoosou hyperbolu se středem v bodě $S[-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}]$, asymptoty procházejí středem a jsou rovnoběžné s osami souřadnými.

Příklad 6.10 Nakreslete graf funkce $f : y = \frac{k}{x}$ (nepřímá úměrnost).

Řešení:



$$f : y = \frac{k}{x} \quad k > 0$$



$$f : y = \frac{k}{x} \quad k < 0$$

Příklad 6.11 V kartézském souřadnicovém systému nakreslete graf funkce


$$f : y = \frac{1-x}{x-2}.$$

Řešení:

$$\text{Upravíme } y = \frac{1-x+2-2}{x-2} = \frac{-x+2-1}{x-2} = -1 - \frac{1}{x-2}, \text{ tedy } y+1 = \frac{-1}{x-2}.$$

Asymptoty procházejí bodem $S[2; -1]$.

Můžeme určit průsečíky se souřadnicovými osami: $X[1; 0]$, $Y[0; -0,5]$



6.4 Exponenciální funkce a logaritmická funkce

Exponenciální funkce o základu $a > 0 \wedge a \neq 1$ je každá funkce


$$f : y = a^x.$$

Definiční obor této funkce $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

Obor hodnot $\mathcal{H}_f = (0; \infty)$.

Pro případ $a = e$ dostaneme **přirozenou** exponenciální funkci.

Graficky:



Inverzní k exponenciální funkci $y = a^x$ je:

Logaritmická funkce o základu $a > 0 \wedge a \neq 1$. Značíme


$$f : y = \log_a x.$$

Definiční obor $\mathcal{D}_f = \{x \in \mathbb{R}, x > 0\}$.

Obor hodnot $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$.

Pro základ $a = e$ dostaneme **přirozený** logaritmus, který používáme nejčastěji.

Graficky:



Příklad 6.12 V téže kartézské soustavě souřadnic načrtněte grafy funkcí:

$$f_1 = 2^x, f_2 = 2^{-x}, f_3 = 2^x + 2^{-x} \text{ a } f_4 = 2^x - 2^{-x}.$$

Řešení:

Sestavíme tabulku pro získání několika funkčních hodnot:

x	-2	-1	0	1	2
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4
2^{-x}	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$2^x + 2^{-x}$	$\frac{17}{4}$	$\frac{5}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	$\frac{17}{4}$
$2^x - 2^{-x}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{15}{4}$

6.5 Logaritmické a exponenciální rovnice

Logaritmické rovnice jsou rovnice, v nichž se vyskytují logaritmy výrazů s neznámou $x \in \mathbb{R}$. Jestliže stanovíme podmínky řešitelnosti a řešíme ekvivalentními úpravami, pak zkouška není nutná.

Příklad 6.13 Řešte v \mathbb{R} logaritmické rovnice:

$$a) \log x + \frac{3}{\log x} = 4 \quad b) \frac{1}{2} \log(2x - 3) = \log(x - 3)$$

Řešení:

$$a) \text{ Podmínky: } x > 0 \wedge \log x \neq 0 \Rightarrow x \in (0, 1) \cup (1, \infty).$$

Rovnici vynásobíme $\log x$, dostaneme

$$\log^2 x - 4 \log x + 3 = 0$$

$$\text{Odtud } \log x_1 = 3 \vee \log x_2 = 1, \text{ je tedy } \underline{\underline{x_1 = 10^3 \vee x_2 = 10^1}}.$$

Obě řešení patří do oboru řešitelnosti.

$$b) \text{ Podmínky } x > \frac{3}{2} \wedge x > 3 \Rightarrow x > 3.$$

$$\text{Úpravou } \log(2x - 3) = 2 \log(x - 3).$$

$$\text{Pak } 2x - 3 = (x - 3)^2, \text{ neboli } 2x - 3 = x^2 - 6x + 9.$$

$$\text{Z toho } 0 = x^2 - 8x + 6 \Rightarrow x_1 = 4, x_2 = 2.$$

Podmínkám vyhovuje pouze $x_1 = 4$.

Exponenciální rovnice jsou rovnice, kde neznámá $x \in \mathbb{R}$ se vyskytuje v exponentu nějaké mocniny. Rovnice řešíme buď logaritmováním, nebo porovnáním exponentu při stejném základu, často až po úpravách.

Příklad 6.14 Řešte v \mathbb{R} exponenciální rovnice.

$$a) \left(\frac{4}{25}\right)^{x+3} \cdot \left(\frac{125}{8}\right)^{4x-1} = \frac{5}{2} \quad b) 3 \cdot 2^x + 2^{3-x} = 10 \quad c) 9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$$

Řešení:

a) Upravíme vše na mocniny o základu $a = \frac{5}{2}$.

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{-2(x+3)} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{3(4x-1)} = \frac{5}{2} \Rightarrow$$

$$-2x - 6 + 12x - 3 = 1 \Rightarrow 10x = 10 \Rightarrow \underline{\underline{x = 1}}$$

b) Položíme $2^x = y$, pak $3y + 8 \cdot \frac{1}{y} = 10$, neboli $3y^2 - 10y + 8 = 0$.

Kořeny

$$y_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 96}}{2} = \begin{cases} 2 \\ \frac{4}{3} \end{cases}$$

Pak je $2^{x_1} = 2 \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 1}}$.


Druhý kořen $2^{x_2} = \frac{4}{3}$ a logaritmováním $\underline{\underline{x_2 = 2 - \log_2 3}}$.

c) Položíme $3^x = y$, pak $y^2 + 2y - 3 = 0 \Rightarrow (y - 1)(y + 3) = 0$.

$$y_1 = 1 \Rightarrow 3^{x_1} = 1 \Rightarrow x_1 = 0$$

$y_2 = -3$ není možné, neboť $3^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Zůstává $\underline{\underline{x = 0}}$.



Příklad 6.15 *Načrtněte grafy funkcí:*

a) $y = 2|x + 1| - 3|x - 1|$, $x \in \mathbb{R}$ b) $y = |x| + x$, $x \in \mathbb{R}$

c) $y = \sqrt{(x - 1)^2}$, $x \in \langle -3; \infty \rangle$

[a) $y = x - 5$, $x \in (-\infty; -1)$; $y = 5x - 1$, $x \in \langle -1; 1 \rangle$; $y = -x + 5$, $x \in \langle 1; \infty \rangle$;

b) $y = 0$, $x \in (-\infty; 0)$; $y = 2x$, $x \in \langle 0; \infty \rangle$;

c) $y = -x + 1$, $x \in \langle -3; 1 \rangle$; $y = x - 1$, $x \in \langle 1; \infty \rangle$]

Příklad 6.16 *Úpravou rovnice paraboly určete souřadnice vrcholu a průsečíky P_1 a P_2 s osou O_x , průsečík Q s osou O_y .*

a) $y = 2x^2 - 4x - 6$ b) $y = -x^2 + 4x$

[a) $y = 2(x - 1)^2 - 8$, $V[1; -8]$, $P_1[-1; 0]$, $P_2[3; 0]$, $Q[0; -6]$;

b) $y = -(x - 2)^2 + 4$, $V[2; 4]$, $P_1[0; 0]$, $P_2[4; 0]$, $Q[0; 0]$]

Příklad 6.17 *Sestrojte graf lineární lomené funkce:*

a) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ b) $y = \frac{1 + 4x}{x}$ c) $y = \frac{2x}{2 + x}$

Příklad 6.18 *Najděte všechna $p \in \mathbb{R}$, pro něž exponenciální funkce $\left(\frac{p}{p+2}\right)^x$ je*

a) *rostoucí,*

b) *klesající.*

[a) $p \in (-\infty; -2)$; b) $p \in (0; \infty)$]

Příklad 6.19 *V téže kartézské soustavě souřadnic nakreslete grafy funkcí:*

a) $y = 1,5^x$, $y = 1,5^{|x|}$, $y = 1,5^{-|x|}$, $y = -1,5^{|x|}$

b) $y = \log_3 x$, $y = \log_3(x - 2)$, $y = \log_3(x + 2)$, $y = 2 - \log_3 x$

Příklad 6.20 *Najděte definiční obor těchto funkcí:*

a) $y = \log_a(x + 3)$ b) $y = \log_3 x^2$ c) $y = \log_5(-x)$

d) $y = \ln \frac{x - 2}{x + 1}$ e) $y = \log_5 \sqrt{4 - x}$ f) $y = \sqrt{\log_3 x}$

g) $y = \log_{\frac{1}{10}} \sqrt{\frac{x}{3 - 2x}}$ h) $y = \ln \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$

[a) $(-3; \infty)$; b) $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$; c) $(-\infty; 0)$;
d) $(-\infty; -1) \cup (2; \infty)$; e) $(-\infty; 4)$; f) $\langle 1; \infty \rangle$; g) $(0; \frac{3}{2})$; h) $(0; 1)$]

Příklad 6.21 *Najděte definiční obor následujících funkcí:*

$$a) y = \sqrt{-x^2 + 7x - 12} \quad b) y = 2^{\sqrt{9-x^2}} + \log(3x - 5)$$

$$c) y = \sqrt{\frac{x+2}{x-1}} + \ln(x+2) \quad d) y = \frac{1}{\sqrt{2x^2 + 5x - 3}}$$

$$e) y = \sqrt{1 - \log \frac{1-x}{1+x}} \quad f) y = \sqrt{x^2 + 2x + 10} + \sqrt{\log(2x + 5)}$$

$$[a) \langle 3; 4 \rangle; b) \left(\frac{5}{3}; 3\right); c) (1; \infty); d) (-\infty; -3) \cup \left(\frac{1}{2}; \infty\right); e) \left(-\frac{9}{11}; 1\right); f) \langle -2; \infty \rangle]$$

Příklad 6.22 Řešte v \mathbb{R} logaritmické rovnice:

$$a) \log(4x + 6) - \log(2x - 1) = 1 \quad b) 2 \log(x - 2) = \log(14 - x)$$

$$c) \log(x + 1) + \log(x - 1) = \log x + \log(x + 2) \quad d) \frac{1}{2} \log(2x - 3) = \log(x - 3)$$

$$[a) x = 1; b) x = 5; c) x \in \{ \}; d) x = 6]$$

Příklad 6.23 Řešte v \mathbb{R} exponenciální rovnice:

$$a) 5^x + 1 - 3 \cdot 5^x = -49$$

$$b) 3^{x+1} + 3^x = 4^{x-1} + 4^x$$

$$c) 3 \cdot 2^{2x+1} + 2 \cdot 3^{2x+3} = 3 \cdot 2^{2x+4} - 3^{2x+2}$$

$$d) \frac{64}{25} \cdot \left(\frac{8}{5}\right)^{\frac{3}{x-1}} = \left(\frac{125}{512}\right)^{3-x}$$

$$[a) x = 2; b) x = 4,0408; c) x = -\frac{1}{2}; d) x = 4 \vee x = \frac{2}{3}]$$

7 Vlastnosti funkce jedné proměnné

7.1 Vlastnosti a druhy funkcí

Sudá funkce, lichá funkce

Nechť je f funkce definována na množině $D(f) \subset \mathbb{R}$, taková, že pro každé $x \in D(f)$ je také $-x \in D(f)$.

Říkáme, že funkce f je **sudá funkce**, jestliže pro každé $x \in D(f)$ je $f(x) = f(-x)$.

Říkáme, že funkce f je **lichá funkce**, jestliže pro každé $x \in D(f)$ je $f(x) = -f(-x)$.

Graf sudé funkce je souměrný podle osy y , graf liché funkce je souměrný podle počátku.


Příklad 7.1 Zjistěte zda funkce :

$$a) y = x^2 \quad b) y = x^3 \quad c) y = (x - 1)^2$$


je sudá nebo lichá.

Řešení:

a) $D(f) = \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$. Funkce je sudá.



Obrázek 7.1: Sudá funkce



Obrázek 7.2: Lichá funkce

b) $D(f) = \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$. Funkce je lichá.

c) $D(f) = \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x - 1)^2 = (x + 1)^2 \neq f(x)$, $(x + 1)^2 \neq f(-x)$.

Funkce není ani sudá ani lichá.

Periodická funkce

Funkce f se nazývá **periodická funkce**, právě když existuje takové reálné číslo $p \neq 0$, že pro každé $x \in D(f)$ je také $x \pm p \in D(f)$ a platí

$$f(x \pm p) = f(x).$$


Číslo p se nazývá **perioda funkce** f .

Jestliže p je perioda funkce f , potom platí, že


$$f(x + kp) = f(x)$$

pro každé $x \in D(f)$ a každé celé k . Má-li tedy periodická funkce f periodu p , pak také každé číslo kp , ($k \neq 0$, celé) je rovněž periodou funkce f .

Nejvýznamnějšími příklady periodických funkcí jsou goniometrické funkce.



$$y = \sin x, \text{ perioda } p = 2\pi$$



$$y = \cotg x, \text{ perioda } p = \pi$$

Omezená funkce

Funkce f se nazývá **zdola omezená na množině** $M \subset D(f)$, právě když existuje takové reálné číslo d , že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq d$.

Funkce f se nazývá **shora omezená na množině** $M \subset D(f)$, právě když existuje takové reálné číslo h , že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq h$.

Funkce f se nazývá **omezená na množině** $M \subset D(f)$, právě když je zdola omezená a shora omezená na množině M .

Monotonní funkce

Funkce f se nazývá **rostoucí na množině** $M \subset D(f)$, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$\text{Je-li } x_1 < x_2 \text{ pak } f(x_1) < f(x_2).$$

Funkce f se nazývá **klesající na množině** $M \subset D(f)$, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$\text{Je-li } x_1 < x_2 \text{ pak } f(x_1) > f(x_2).$$

Funkce f se nazývá **neklesající na množině** $M \subset D(f)$, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$\text{Je-li } x_1 < x_2 \text{ pak } f(x_1) \leq f(x_2).$$

Funkce f se nazývá **nerostoucí na množině** $M \subset D(f)$, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$\text{Je-li } x_1 < x_2 \text{ pak } f(x_1) \geq f(x_2).$$

Rostoucí a klesající funkce se souhrnně nazývají **ryze monotonní funkce na množině** M ; nerostoucí a neklesající funkce se souhrnně nazývají **monotonní funkce na množině** M .

7.2 Inverzní funkce

Funkce f s definičním oborem $D(f)$ se nazývá **prostá funkce** právě když pro každou dvojici $x_1, x_2 \in D(f)$, $x_1 \neq x_2$ platí $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Je-li f prostá funkce s definičním oborem $D(f)$, a oborem hodnot $H(f)$, potom k tomuto zobrazení existuje zobrazení inverzní, které je opět prosté a zobrazuje množinu $H(f)$ na množinu $D(f)$. Je to **funkce inverzní k funkci** f a značíme ji f^{-1} .


Platí, že $D(f^{-1}) = H(f)$ a $H(f^{-1}) = D(f)$ a $x = f^{-1}(y)$ právě když $y = f(x)$.

Graf inverzní funkce f^{-1} je souměrný s grafem funkce f podle přímky o rovnici $y = x$.

Příklad 7.2 Určete funkci inverzní k funkci $f : y = 3x + 2$.

Řešení:

Funkce f je lineární a je prostá.



Obrázek 7.3: Inverzní funkce k funkci $f : y = 3x + 2$

Inverzní funkci budeme hledat tak, že zaměníme x a y a z nové rovnice vyjádříme y .

$$f^{-1} : x = 3y + 2$$

$$\text{Z toho } \underline{\underline{f^{-1} : y = \frac{1}{3}(x - 2)}}.$$

Pro definiční obor inverzní funkce platí, že $D(f^{-1}) = H(f) = \mathbb{R}$.

Příklad 7.3 Určete funkci inverzní k funkcím :

$$a) y = \ln(2x + 8) \quad b) y = \frac{2x - 5}{x - 1}$$

Řešení:

a) Definičním oborem funkce bude řešení nerovnice $2x + 8 > 0$.

Dostaneme $D(f) = (-4, \infty)$.

Funkce f je logaritmická funkce složená s lineární. Je to funkce složená ze dvou prostých funkcí, tedy je i f prostá funkce.

Zaměníme x a y a z této nové rovnice vyjádříme y .

$$f^{-1} : x = \ln(2y + 8)$$

Inverzní funkce k logaritmické funkci je exponenciální funkce. Aplikujeme tedy exponenciální funkci na obě strany rovnice a dostaneme:

$$e^x = 2y + 8 \quad e^x - 8 = 2y$$

Proto inverzní funkce k funkci $f : y = \ln(2x + 8)$ je funkce

$$\underline{\underline{f^{-1} : y = \frac{e^x - 8}{2}}}$$

Pro definiční obor inverzní funkce platí, že

$$D(f^{-1}) = \mathbb{R},$$

a pro obor hodnot inverzní funkce platí, že

$$H(f^{-1}) = D(f) = (-4, \infty).$$

b) Aby byla funkce $y = \frac{2x - 5}{x - 1}$ definovaná, musí být $x \neq 1$.

Můžeme tedy psát, že $D(f) = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.

Funkce f je lineární lomená funkce, a je i prostá (grafem této funkce je hyperbola). Pro výpočet inverzní funkce zaměníme v zadání funkce x a y .

$$f^{-1} : x = \frac{2y - 5}{y - 1} \Rightarrow$$

$$x(y - 1) = 2y - 5 \Rightarrow xy - x = 2y - 5 \Rightarrow xy - 2y = x - 5 \Rightarrow y(x - 2) = x - 5$$

$$\underline{\underline{f^{-1} : y = \frac{x - 5}{x - 2}}}$$

Pro definiční obor inverzní funkce platí, že $x \neq 2$.

$$D(f^{-1}) = (-\infty, 2) \cup (2, \infty) = H(f),$$

a pro obor hodnot inverzní funkce platí, že

$$H(f^{-1}) = D(f) = (-\infty, 1) \cup (1, \infty).$$

Příklad 7.4 Zjistěte zda je funkce :

$$a) y = \frac{x^3}{\sin x} \quad b) y = x^2 \sin x \quad c) y = \frac{\sin x}{x-1} \quad d) y = e^x \cos x$$

sudá nebo lichá.

[a) sudá b) lichá c) ani sudá ani lichá d) ani sudá ani lichá]

Příklad 7.5 Určete funkci inverzní k funkcím :

$$a) y = 3x - 4 \quad b) y = 10^x + 5 \quad c) y = \frac{2x + 1}{3x - 6}$$

[a) $(x + 4)/3$ b) $\log(x - 5)$ c) $(6x + 1)/(3x - 2)$]

Příklad 7.6 Najděte příklad (načrtněte graf) funkce, která je :

a) omezená zdola na svém definičním oboru

b) omezená shora na svém definičním oboru

c) omezená shora i zdola na intervalu $(0, 5)$

d) rostoucí na svém definičním oboru

e) klesající na intervalu $(-6, 0)$

f) periodická na svém definičním oboru

g) prostá na svém definičním oboru

h) není prostá na svém definičním oboru

8 Goniometrické funkce


8.1 Oblouková míra

V matematice, ve fyzice a v technické praxi se používá na určování velikosti úhlu tzv. **oblouková míra**.

Je dán úhel ABC . Sestrojíme kružnici se středem v bodě B , (ve vrcholu úhlu). Jestliže r je poloměr kružnice a s je délka oblouku kružnice uvnitř úhlu ABC , potom velikost tohoto úhlu je $\frac{s}{r}$ radiánů.

$$\angle ABC = \frac{s}{r} \text{ rad.}$$

Toto číslo nezávisí na poloměru kružnice.



Příklad 8.1 Vyjádřete úhel 15° v obloukové míře.

Řešení:

Kružnice má délku $2\pi r$ a velikost úhlu 360° v radiánech je $\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$.

Z toho $1^\circ = \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{180}$ radiánů.

Tedy $15^\circ = 15 \cdot \frac{\pi}{180} = \underline{\underline{\frac{\pi}{12}}}$.

Dále budeme pracovat s orientovanými úhly. **Orientovaný úhel** si můžeme představit jako počáteční a koncovou polohu polopřímky (nejlépe kladné poloosy O_x) otáčející se kolem svého počátku a to v jednom ze dvou navzájem opačných smyslů. Buď proti pohybu hodinových ručiček, tak dostaneme kladné úhly (např. $\frac{\pi}{2}$, 6π , atd), nebo ve směru hodinových ručiček a tak dostaneme záporné úhly (např. $-\frac{\pi}{12}$, -4π , atd).

8.2 Goniometrické funkce

V kartézské souřadnicové soustavě sestrojme kružnici o středu v počátku a poloměru 1. Uvažujme orientovaný úhel o velikosti ψ radiánů jehož vrchol je v počátku a počáteční rameno kladná poloosa x . Druhé rameno protne kružnici v bodě P . Potom definujeme **kosinus** úhlu ψ jako x -ovou souřadnici bodu P . Označujeme $\cos \psi$.


Podobně y -ová souřadnice bodu P se nazývá **sinus** úhlu ψ . Označujeme $\sin \psi$.

Obě funkce jsou periodické, jejich nejmenší perioda je 2π .


Definičním oborem obou funkcí je \mathbb{R} , oborem hodnot je $\langle -1; 1 \rangle$.

Grafem je sinusoida (kosinusoida).

Snadno se dá ukázat, že pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí $\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$.



$y = \sin x$



$y = \cos x$

Funkce $f : y = \sin x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ je lichá: $\sin(-x) = -\sin x$.

Funkce $f : y = \cos x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ je sudá: $\cos(-x) = \cos x$.

Tangens je funkce, která každému reálnému číslu x , pro něž je $\cos x \neq 0$, přiřadí číslo

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Definičním oborem této funkce je $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{2k+1}{2}\pi, \text{ kde } k \text{ je celé číslo} \}$.


Oborem hodnot je $\mathcal{H} = \mathbb{R}$.

Kotangens je funkce, která každému reálnému číslu x , pro něž je $\sin x \neq 0$, přiřadí číslo


$$\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Definičním oborem této funkce je $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}, x \neq k\pi, \text{ kde } k \text{ je celé číslo} \}$.

Oborem hodnot je $\mathcal{H} = \mathbb{R}$.



$y = \operatorname{tg} x$



$y = \operatorname{cotg} x$

Funkce $\operatorname{tg} x$ a $\operatorname{cotg} x$ jsou periodické funkce s periodou π .

Obě funkce jsou liché: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ a $\operatorname{cotg}(-x) = -\operatorname{cotg} x$ pro všechna x z definičního oboru.

V následující tabulce jsou vypočteny hodnoty goniometrických funkcí pro některá $x \in (0; 2\pi)$, které je vhodné si pamatovat.

Tabulka 8.1: Hodnoty goniometrických funkcí pro některé důležité úhly

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		0	
$\operatorname{cotg} x$		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0		0

Dále uvedeme některé důležité vzorce, které budou užitečné při řešení úloh souvisejících s goniometrickými funkcemi.

Pro každé $x \in (0; \frac{\pi}{2})$ platí:

$$\sin x = \sin(\pi - x) = -\sin(\pi + x) = -\sin(2\pi - x)$$

$$\cos x = -\cos(\pi - x) = -\cos(\pi + x) = \cos(2\pi - x)$$

$$\operatorname{tg} x = -\operatorname{tg}(\pi - x) ; \quad \operatorname{cotg} x = -\operatorname{cotg}(\pi - x)$$

Příklad 8.2 Vypočítejte hodnoty goniometrických funkcí v daných bodech :

$$a) \alpha = \frac{5}{3}\pi \quad b) \alpha = -\frac{2}{3}\pi \quad c) \alpha = \frac{25}{4}\pi$$

Řešení:

$$a) \alpha = \frac{5}{3}\pi = 2\pi - \frac{1}{3}\pi$$

$$\sin(2\pi - \frac{1}{3}\pi) = -\sin(\frac{1}{3}\pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin \alpha = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}}$$

$$\cos(2\pi - \frac{1}{3}\pi) = \cos(\frac{1}{3}\pi) = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \alpha = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \underline{\underline{-\sqrt{3}}} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{3}}}$$

$$b) \alpha = -\frac{2}{3}\pi$$

Funkce $\sin x$, $\cos x$ jsou periodické s periodou 2π . Platí:

$$\sin \alpha = \sin(\alpha + 2\pi) = \sin \frac{4}{3}\pi = \sin(\pi + \frac{1}{3}\pi) = -\sin(\frac{1}{3}\pi) = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}}$$

$$\cos \alpha = \cos(\alpha + 2\pi) = \cos \frac{4}{3}\pi = \cos(\pi + \frac{1}{3}\pi) = \underline{\underline{-\frac{1}{2}}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \underline{\underline{\sqrt{3}}} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}}$$

$$c) \alpha = \frac{25}{4}\pi$$

$$\sin(\frac{25}{4}\pi) = \sin(\frac{1}{4}\pi + 6\pi) = \sin \frac{1}{4}\pi = \underline{\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}}$$

$$\cos(\frac{25}{4}\pi) = \cos(\frac{1}{4}\pi + 6\pi) = \cos \frac{1}{4}\pi = \underline{\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg} \alpha = \underline{\underline{1}}$$

Důležité vztahy a vzorce

Pro každé reálné x platí:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Pro každé reálné x a celé k , $x \neq k \cdot \frac{\pi}{2}$ platí:

$$\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1$$

Funkce dvojnásobného a polovičního argumentu

$$\forall x \in \mathbb{R} : \sin 2x = 2 \sin x \cos x;$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \left| \sin \frac{x}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}};$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \left| \cos \frac{x}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

Součtové vzorce

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x, y \neq \frac{2k+1}{2}\pi : \operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y}$$

Příklad 8.3 Vypočítejte $\cos \frac{5}{12}\pi$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \cos \frac{5}{12}\pi &= \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Příklad 8.4 Vypočítejte hodnoty funkcí $\cos \alpha$, $\sin(2\alpha)$, $\operatorname{tg}(2\alpha)$, $\sin \frac{\alpha}{2}$, jestliže

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

Řešení:

$$|\cos \alpha| = \cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \underline{\underline{\frac{4}{5}}}$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{25} = \underline{\underline{\frac{24}{25}}}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25} \quad \Rightarrow \operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \underline{\underline{\frac{24}{7}}}$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad 0 < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{4} \quad \Rightarrow \quad \left| \sin \frac{\alpha}{2} \right| = \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = \underline{\underline{\sqrt{\frac{1}{10}}}}$$

8.3 Goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice jsou rovnice, které obsahují neznámou jako argument jedné nebo několika goniometrických funkcí.

Příklad 8.5 Vyřešte v \mathbb{R} goniometrické rovnice:

$$a) 2 \sin(3x) = \sqrt{2} \quad b) \sin^2 x - \cos^2 x = 0,5 \quad c) 2 \sin^2 x - 5 \cos x + 1 = 0$$

Řešení:

$$a) \text{ Upravíme: } \sin(3x) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Funkce sinus má kladné hodnoty v I. a II. kvadrantu.

$$\text{Tedy } 3x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \vee \quad 3x = \frac{3}{4}\pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Odtud}$$

$$\underline{\underline{x = \frac{\pi}{12} + \frac{2}{3}k\pi}} \quad \vee \quad \underline{\underline{x = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3}k\pi}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

b) Upravíme levou stranu rovnice:

$$\sin^2 x - \cos^2 x = -(\cos^2 x - \sin^2 x) = -\cos(2x).$$

Potom rovnice má tvar $-\cos(2x) = 0,5$, tzn. $\cos(2x) = -0,5$.

Funkce kosinus má záporné hodnoty v II. a III. kvadrantu.

$$\text{Potom } 2x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \vee \quad 2x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Odtud}$$

$$\underline{\underline{x = \frac{1}{3}\pi + k\pi}} \quad \vee \quad \underline{\underline{x = \frac{2}{3}\pi + k\pi}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

c) Upravíme levou stranu rovnice:

$$2 \sin^2 x - 5 \cos x + 1 = 2(1 - \cos^2 x) - 5 \cos x + 1 = -2 \cos^2 x - 5 \cos x + 3$$

Potom rovnice má tvar $-2 \cos^2 x - 5 \cos x + 3 = 0$ t.j. $2 \cos^2 x + 5 \cos x - 3 = 0$.

Položíme $y = \cos x$ a dostaneme kvadratickou rovnici $2y^2 + 5y - 3 = 0$.

Tato rovnice má kořeny $y_1 = -3$ a $y_2 = \frac{1}{2}$.

Protože $|-3| > 1$, řešíme jen rovnici $\cos x = \frac{1}{2}$.

Funkce kosinus má kladné hodnoty v I. a IV. kvadrantu. Dostaneme

$$\underline{\underline{x = \frac{1}{3}\pi + 2k\pi}} \quad \vee \quad \underline{\underline{x = \frac{5}{3}\pi + 2k\pi}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Příklad 8.6 Vypočítejte následující úhly v obloukové míře:

a) $\alpha = 135^\circ$ b) $\alpha = -75^\circ$ c) $\alpha = 200^\circ$

[a) $\frac{3}{4}\pi$; b) $-\frac{5}{12}\pi$; c) $\frac{10}{9}\pi$]

Příklad 8.7 Vypočítejte hodnoty goniometrických funkcí $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$ v daných bodech :

a) $\alpha = -\frac{7}{3}\pi$ b) $\alpha = \frac{21}{4}\pi$ c) $\alpha = \frac{5}{6}\pi$ d) $\alpha = -\frac{11}{4}\pi$

[a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$; b) $-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, 1$; c) $\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{3}$;
d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, 1$]

Příklad 8.8 Vypočítejte hodnoty goniometrických funkcí $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ jestliže platí, že $\operatorname{cotg} x = -3$ a $x \in \langle \frac{3}{2}\pi; 2\pi \rangle$.

[$\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{3\sqrt{10}}{10}, -\frac{1}{3}$]

Příklad 8.9 Dokažte, že pro každá dvě reálná čísla α , β platí vzorce:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

[postupným sečtením a odečtením součtových vzorců pro funkce sinus a kosinus]

Příklad 8.10 Vyřešte v \mathbb{R} goniometrické rovnice:

a) $\cos(x - \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$

c) $\frac{\sin x}{\sqrt{2} + \cos x} = 1$ d) $\sqrt{3} \operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0$

e) $2 \sin x = \sqrt{3} \operatorname{tg} x$ f) $\sin x + \cos 2x = 1$

g) $\sin^4 x - \cos^4 x = \frac{1}{2}$ h) $1 + \sin x = 2 \cos^2 x$

[a) $\frac{13}{12}\pi + 2k\pi \vee \frac{17}{12}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; b) $2k\pi \vee \frac{\pi}{3} + 2k\pi \vee \frac{5}{3}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$;
c) $\frac{1}{4}\pi + 2k\pi \vee \frac{3}{4}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; d) $\frac{\pi}{3} + k\pi \vee \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$;
e) $k\pi \vee \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee \frac{11}{6}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; f) $k\pi \vee \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee \frac{5}{6}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$;
g) $\frac{\pi}{3} + k\pi \vee \frac{2}{3}\pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$; h) $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee \frac{5}{6}\pi + 2k\pi \vee \frac{3}{2}\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$]

Příklad 8.11 Řešte v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ rovnici $\frac{\operatorname{tg} x + 1}{\operatorname{tg} x - 1} = 2 + \sqrt{3}$.

$$\left[\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi\right]$$

Příklad 8.12 Řešte v intervalu $\langle 0; \frac{\pi}{2} \rangle$ rovnici $\sin^2 x + \operatorname{tg}^2 x = \frac{3}{2}$.

$$\left[\frac{\pi}{4}\right]$$

Příklad 8.13 Upravte následující výrazy pro každé $x \in \mathbb{R}$, pro které jsou definovány:

$$\begin{array}{ll} a) \frac{2 \sin x + \sin 2x}{\cos^2 \frac{x}{2}} & b) \frac{\sin^3 x - \sin x}{\cos^3 x - \cos x} \\ c) \frac{\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x - \operatorname{cotg}^2 x} & d) \frac{(\sin x + \cos x)^2}{1 + \sin 2x} \end{array}$$

$$[a) 4 \sin x; b) \operatorname{cotg} x; c) \operatorname{tg}^6 x; d) 1]$$

Příklad 8.14 Načrtněte grafy funkcí:

$$a) y = -\sin(3x) \quad b) y = 1 + \cos \frac{x}{2} \quad c) y = 2 + \operatorname{cotg} x \quad d) y = 5 + 2 \sin(x + \pi)$$

9 Komplexní čísla

9.1 Algebraický tvar komplexního čísla

Komplexní číslo je číslo $z = a + ib$, kde a, b jsou reálná čísla a $i^2 = -1$. Výraz je jednoznačně určen uspořádanou dvojicí $[a; b]$, kde a, b jsou reálná čísla.

Pro komplexní čísla se dají operace sčítání a násobení definovat takto:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d),$$

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc),$$

kde $a + ib$ a $c + id$ jsou libovolná komplexní čísla.

Sčítání a násobení komplexních čísel jsou operace asociativní a komutativní. Násobení je distributivní vzhledem ke sčítání.

Příklad 9.1 Vypočítejte součin $(2 + i)(3 + i)$.

Řešení:

$$(2 + i)(3 + i) = 6 + 3i + 2i - 1 = (6 - 1) + i(3 + 2) = \underline{\underline{5 + 5i}}$$

Zápis $z = a + ib$ nazýváme **algebraickým tvarem** komplexního čísla.

Reálné číslo a nazýváme **reálnou částí** z .

Reálné číslo b nazýváme **imaginární částí** z :

$$z = a + ib, \quad a = \mathbf{Re} \, z, \quad b = \mathbf{Im} \, z.$$

Číslo $\bar{z} = a - ib$ nazýváme **komplexně sdruženým** číslem k číslu $z = a + ib$.

Při dělení komplexních čísel využíváme komplexně sdružené číslo jmenovatele:

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{a + ib}{c + id} \cdot \frac{c - id}{c - id} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \quad a + ib, c + id \in \mathbb{C}, \quad c, d \neq 0$$

Příklad 9.2 Vyjádřete v algebraickém tvaru komplexní číslo $\frac{2 + i}{1 - i}$.

Řešení:

$$\frac{2 + i}{1 - i} = \frac{2 + i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} = \frac{2 + 2i + i + i^2}{1 - i^2} = \frac{2 - 1 + 3i}{1 - (-1)} = \underline{\underline{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i}}$$

Komplexní čísla zjednodušíme podle pravidel:

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \dots,$$

to znamená, že pro každé $k \in \mathbb{Z}$ je

$$i^{4k} = 1, \quad i^{4k+1} = i, \quad i^{4k+2} = -1, \quad i^{4k+3} = -i.$$

Příklad 9.3 Vypočítejte $i + i^3 + i^5 + i^7 + i^9$.

Řešení:

$$i + i^3 + i^5 + i^7 + i^9 = i + i^2i + i^4i + i^4i^3 + (i^4)^2i = i - i + i - i + i = \underline{\underline{i}}$$

Absolutní hodnotou komplexního čísla $a + ib$ nazýváme nezáporné číslo $\sqrt{a^2 + b^2}$,

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}.$$

Komplexní číslo z , pro které je $|z| = 1$ nazýváme **komplexní jednotkou**.

Komplexní rovina (Gaussova rovina komplexních čísel) je rovina s kartézským systémem souřadnic, ve které je každé komplexní číslo $a + ib$ znázorněno bodem $[a; b]$.

Absolutní hodnota čísla $z = a + ib$ se potom rovná vzdálenosti bodu $[a; b]$ od počátku.

Absolutní hodnota rozdílu dvou komplexních čísel se rovná jejich vzdálenosti v komplexní rovině.

9.2 Goniometrický tvar komplexního čísla

Úhel φ - orientovaný úhel mezi kladnou částí osy x a polopřímkou spojující bod $[0; 0]$ s bodem $[a; b]$ se nazývá **argumentem** komplexního čísla $z = a + ib$. Platí, že

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Odtud dostaneme, že

$$a = |z| \cos \varphi \quad b = |z| \sin \varphi.$$

Zápis nenulového komplexního čísla z ve tvaru

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

nazýváme **goniometrickým tvarem** komplexního čísla z .

Omezíme-li se na $-\pi < \varphi \leq \pi$ (ev. $0 \leq \varphi < 2\pi$), je toto číslo určeno jednoznačně.

Příklad 9.4 Zapište v goniometrickém tvaru číslo $z = 2 + 2i$.

Řešení:

$$|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$$

$$\sin \varphi = \frac{2}{\sqrt{8}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Takže $\varphi = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ a $\varphi \in (-\pi; \pi)$, potom $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

Tedy :

$$2 + 2i = \underline{\underline{\sqrt{8}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})}}$$

9.3 Moivreova věta

Vyjádření komplexních čísel v goniometrickém tvaru podstatně zjednodušuje výpočty spojené s násobením a dělením komplexních čísel. Pro každá dvě nenulová komplexní čísla $u = |u|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ a $v = |v|(\cos \beta + i \sin \beta)$ platí:

$$uv = |u| \cdot |v|(\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta))$$

a

$$\frac{u}{v} = \frac{|u|}{|v|}(\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta)).$$

Pro umocňování platí **Moivreova věta**:

$$z^n = (|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = |z|^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi), n \in \mathbb{N}$$

Příklad 9.5 Vypočtěte uv , u/v a u^3 , jestliže

$$u = 2(\cos \frac{1}{3}\pi + i \sin \frac{1}{3}\pi) \quad v = 6(\cos(-\frac{1}{2}\pi) + i \sin(-\frac{1}{2}\pi)).$$

Řešení:

Absolutní hodnota součinu je $2 \cdot 6 = 12$ a argument $\frac{1}{3}\pi + (-\frac{1}{2}\pi) = -\frac{1}{6}\pi$.

Proto

$$uv = 12(\cos(-\frac{1}{6}\pi) + i \sin(-\frac{1}{6}\pi)) = 12(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i) = \underline{\underline{6\sqrt{3} - 6i}}$$

Absolutní hodnota podílu je $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ a argument $\frac{1}{3}\pi - (-\frac{1}{2}\pi) = \frac{5}{6}\pi$. Tedy

$$\frac{u}{v} = \frac{1}{3}(\cos \frac{5}{6}\pi + i \sin \frac{5}{6}\pi) = \frac{1}{3}(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i) = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{6}i}}$$

Podobně dostaneme podle Moivreovy věty:

$$u^3 = 8(\cos \pi + i \sin \pi) = 8(-1) = \underline{\underline{-8}}$$

9.4 Řešení binomických rovnic v \mathbb{C}

Binomickou rovnicí se nazývá rovnice tvaru $z^n - a = 0$, kde $a \neq 0$ je dané komplexní číslo, z je neznámá a $n > 1$ je číslo přirozené. Tato rovnice má v oboru komplexních čísel právě n různých kořenů. Řešit binomickou rovnicí v \mathbb{C} znamená využitím Moivreovy věty najít všech n komplexních řešení této rovnice. Zapišeme číslo a v goniometrickém tvaru:

$$a = |a|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Potom podle důsledku Moivreovy věty dostaneme řešení ve tvaru:

$$z_k = |a|^{\frac{1}{n}}(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n}), k = 0, 1, \dots, n-1$$

Příklad 9.6 V \mathbb{C} řešte rovnici $z^3 + 27 = 0$.

Řešení:

Upravíme na $z^3 = -27$. Napišme $a = -27$ v goniometrickém tvaru:

$$-27 = 27(\cos \pi + i \sin \pi) = 27(\cos(\pi + 2k\pi) + i \sin(\pi + 2k\pi))$$

Z Moivreovy věty dostaneme řešení

$$z = \sqrt[3]{27} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

$$\Rightarrow z_1 = 3 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \underline{\underline{\frac{3}{2} + i \frac{3\sqrt{3}}{2}}}$$

$$z_2 = 3(\cos \pi + i \sin \pi) = \underline{\underline{-3}}$$

$$z_3 = 3 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) = 3 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \underline{\underline{\frac{3}{2} - i \frac{3\sqrt{3}}{2}}}$$

Příklad 9.7 Vypočítejte:

a) $(2 - 3i)(4 + i)$ b) $(1 + i)i$ c) $(-1 + i)^{-2}$

d) $(-i)^{27}$ e) i^{2000} f) $5 - 8i + 6i^2 - 3i^3 + 6i^4$

[a) $11 - 10i$; b) $-1 + i$; c) $i/2$; d) i ; e) 1 ; f) $5 - 5i$]

Příklad 9.8 Vyjádřete v algebraickém tvaru komplexní čísla:

a) $(i^{10} - i^{12} - 4i^{15}) : (i^5 - i^3)$ b) $\frac{2+i}{3-i} + (i-2)(4-i)$

c) $\left(\frac{i-1}{i} + \frac{2i}{i-1} \right) (2i-3) - (i-1)i$

[a) $2 + i$; b) $-13/2 + 13i/2$; c) $-5 + 5i$]

Příklad 9.9 Přesvědčte se, že $\frac{1}{1-i} - i - \frac{1}{1+i} + i = 2i$.

[Platí]

Příklad 9.10 Najděte dvojici komplexních čísel tak, aby jejich součet byl 4 a součin 13.

[$2 + 3i, 2 - 3i$]

Příklad 9.11 Určete reálná čísla x, y pro která platí:

$$a) \frac{3 - 2i}{1 - i} = 2x + yi$$

$$b) (x + y)(5 - 4i) + (x - y)(4 - 5i) = 94 - 68i$$

$$c) \frac{x + 1 + (y + 3)i}{5 + 3i} = 1 + i$$

$$[a) x = 5/4, y = 1/2; b) x = 9, y = 13; c) x = 1, y = 5]$$

Příklad 9.12 K číslu z napište číslo komplexně združené \bar{z} a vypočítejte $|z|$:

$$a) z = 4 - 3i \quad b) z = \frac{1 + 2i}{3}$$

$$[a) 4 + 3i, |z| = 5; b) \frac{1-2i}{3}, |z| = \sqrt{5}/3]$$

Příklad 9.13 Určete komplexní čísla z , pro něž platí $z = \bar{z}$.

$$[z \in \mathbb{R}]$$

Příklad 9.14 V komplexní rovině zobrazte množinu všech komplexních čísel, pro něž platí:

$$a) |1 + z| < 2 \quad b) |1 - i| \geq |z| > \frac{1}{2} \quad c) \operatorname{Im} z < 4$$

Příklad 9.15 Pomocí vztahu $|\frac{z_1}{z_2}| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla

$$\frac{x^2 - y^2 + 2xyi}{xy\sqrt{2} + i\sqrt{x^4 + y^4}}, \quad x, y \neq 0.$$

$$[1]$$

Příklad 9.16 Vyjádřete následující komplexní čísla v goniometrickém tvaru:

$$a) 1 - i \quad b) -2 \quad c) 5i \quad d) \frac{i - 3}{2 + i} \quad e) \frac{2 - i}{3i - 1}$$

$$[a) \sqrt{2}(\cos(-\pi/4) + i \sin(-\pi/4)); b) 2(\cos \pi + i \sin \pi);$$

$$c) 5(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2)); d) \sqrt{2}(\cos(3\pi/4) + i \sin(3\pi/4));$$

$$e) (\sqrt{2}/2)(\cos(-3\pi/4) + i \sin(-3\pi/4))]$$

Příklad 9.17 Napište algebraický tvar komplexního čísla $z = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$.

$$[\sqrt{3}/2 + i/2]$$

Příklad 9.18 Vypočítejte algebraický tvar součinu a podílu komplexních čísel:

$$a) z_1 = 6\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) \quad z_2 = \frac{1}{3}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$$

$$b) z_1 = \sqrt{3} + i \quad z_2 = 6\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$$

$$[a) z_1 z_2 = -1 + \sqrt{3} i; z_1/z_2 = 9 + 9\sqrt{3} i; b) z_1 z_2 = 12i; z_1/z_2 = \frac{1}{6}(\sqrt{3} - i)]$$

Příklad 9.19 Pomocí Moivreovy věty vypočítejte:

$$a) (-1 + i\sqrt{3})^3 \quad b) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^{100}$$

$$[a) 8; b) -1/2 - \sqrt{3} i/2]$$

Příklad 9.20 Jestliže $z = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$, najděte algebraický tvar komplexního čísla $z^3 + \frac{1}{z^3}$.

$$[-\sqrt{2}]$$

Příklad 9.21 Vyřešte v \mathbb{C} kvadratické rovnice:

$$a) z^2 + 2z + 2 = 0 \quad b) z^2 + 6z + 25 = 0$$

$$[a) -1 \pm i; b) -3 \pm 4i]$$

Příklad 9.22 Vyřešte v \mathbb{C} následující rovnice:

$$a) z^4 = 1 \quad b) z^3 = 1/8 \quad c) z^6 = -64$$

$$[a) 1, i, -1, -i; b) \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}(1 - \sqrt{3}i), -\frac{1}{4}(1 + \sqrt{3}i); c) 2i, -2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, \sqrt{3} - i, -\sqrt{3} - i]$$

10 Vektorová algebra a analytická geometrie

10.1 Základní operace s vektory

Vektorem nazýváme množinu všech souhlasně orientovaných úseček téže velikosti.

Je-li $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ libovolný nenulový vektor s počátečním bodem $A[a_1; a_2; a_3]$ a koncovým bodem $B[b_1; b_2; b_3]$, pak **souřadnice vektoru** \vec{u} jsou:

$$u_1 = b_1 - a_1, \quad u_2 = b_2 - a_2, \quad u_3 = b_3 - a_3.$$

Zapisujeme $\vec{u}(u_1; u_2; u_3)$.

Je-li $A = B$, pak dostáváme vektor nulový $\vec{o}(0; 0; 0)$.

U vektorů v rovině vypustíme třetí souřadnici.

Pro vektory $\vec{u}(u_1; u_2; u_3)$ a $\vec{v}(v_1; v_2; v_3)$ zavádíme:

velikost vektoru $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

rovnost vektorů $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow (u_1 = v_1) \wedge (u_2 = v_2) \wedge (u_3 = v_3)$

součet vektorů $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2; u_3 + v_3)$

rozdíl vektorů $\vec{u} - \vec{v} = \vec{w} = (u_1 - v_1; u_2 - v_2; u_3 - v_3)$

opačný vektor k \vec{u} $-\vec{u} = (-u_1; -u_2; -u_3)$

k -násobek vektoru $k\vec{u} = (ku_1; ku_2; ku_3), k \in \mathbb{R}, k \neq 0$

skalární součin $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

úhel φ dvou vektorů $\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}, \varphi \in \langle 0; 2\pi \rangle$

10.2 Přímka v rovině

Přímka p v rovině:

Je-li přímka p určena bodem $A[a_1; a_2]$ a nenulovým směrovým vektorem $\vec{s}(s_1; s_2)$ jsou její **parametrické rovnice**

$$x = a_1 + ts_1, \quad y = a_2 + ts_2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Budeme používat i zkrácený zápis $p \equiv \{[a_1 + ts_1; a_2 + ts_2], t \in \mathbb{R}\}$. Vyloučením parametru t z parametrických rovnic dostaneme **obecnou rovnici** přímky

$$p \equiv ax + by + c = 0.$$

Je-li v této rovnici $b \neq 0$, lze najít **směrnicevý tvar** $p \equiv y = kx + q; k, q \in \mathbb{R}$.

Vzdálenost bodu $M[x_0; y_0]$ **od přímky** $p \equiv ax + by + c = 0$ je dána

$$d(M, p) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pro **odchylku dvou přímek** $p_1 \equiv a_1x + b_1y + c_1 = 0$ a $p_2 \equiv a_2x + b_2y + c_2 = 0$ lze odvodit

$$\cos \varphi = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}, \quad \varphi \in \langle 0; \frac{\pi}{2} \rangle.$$

Jsou-li přímky p_1 a p_2 kolmé, pak pro jejich směrnice k_1 a k_2 platí $k_1 \cdot k_2 = -1$.

Příklad 10.1 *Přímka je určena body $A[6; -1], B[2; 3]$. Najděte všechny tvary rovnice této přímky.*

Řešení:

Směrový vektor této přímky je $\vec{s} = (-4; 4)$. Parametrické rovnice tedy jsou

$$\underline{\underline{x = 6 - 4t, \quad y = -1 + 4t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Sečtením těchto rovnic a vyloučením parametru t dostaneme obecnou rovnici

$$\underline{\underline{x + y - 5 = 0.}}$$

Jednoduchou úpravou dostáváme

$$\underline{\underline{\frac{x}{5} + \frac{y}{5} = 1,}}$$

připomínáme tímto úsekový tvar rovnice přímky. Úseky, které přímka vytíná na souřadnicových osách jsou stejné a rovny pěti.

Z obecného tvaru odvodíme směrniceový

$$\underline{\underline{y = -x + 5.}}$$

Vidíme, že směrnice $k = -1$, úhel přímky s kladným směrem osy x je $\alpha = \frac{3\pi}{4}$.

Příklad 10.2 *V trojúhelníku ABC , kde $A[7; 8], B[5; -2], C[-3; -6]$, určete velikost výšky v_a a napište rovnici přímky, na níž leží výška v_a .*

Řešení:

Výška v_a má velikost rovnou vzdálenosti bodu A od přímky p , na níž leží strana BC .

Je $\vec{BC} = C - B = (-8; -4)$.

Parametrické rovnice přímky p jsou:

$$x = -3 - 8t, \quad y = -6 - 4t.$$

Odtud obecná rovnice $x - 2y - 9 = 0$. Tedy

$$d(A, p) = \frac{|1 \cdot 7 - 2 \cdot 8 - 9|}{\sqrt{1 + 4}} = \underline{\underline{\frac{18\sqrt{5}}{5}}}.$$

Směrnice rovnice přímky p je $y = \frac{x}{2} - \frac{9}{2}$, směrnice výšky v_a je tedy

$$k = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = -2.$$

Rovnice přímky rovnoběžné s výškou pak je $y = -2x + q$ a posunutí q dostaneme z podmínky, že výška v_a bodem A prochází, tedy $8 = -2 \cdot 7 + q \Rightarrow q = 22$.

Je tedy $-2x + 22 = y$ rovnice přímky na níž výška v_a leží.

Příklad 10.3 Určete odchylku přímek

$$p_1 \equiv 3x - 2y + 10 = 0 \text{ a } p_2 \equiv 5x + y - 13 = 0.$$

Řešení:

$$\text{Je } \cos \varphi = \frac{|a_1 a_2 + b_1 b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}} = \frac{|3 \cdot 5 - 2 \cdot 1|}{\sqrt{9 + 4} \sqrt{25 + 1}} = \frac{|13|}{\sqrt{13} \sqrt{26}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ tedy } \underline{\underline{\varphi = \frac{\pi}{4}}}.$$

10.3 Přímka v prostoru a rovnice roviny

Přímka p v prostoru:

Je-li přímka p určena bodem $A[a_1; a_2; a_3]$ a nenulovým směrovým vektorem $\vec{s}(s_1; s_2; s_3)$ jsou její **parametrické rovnice**

$$x = a_1 + ts_1, y = a_2 + ts_2, z = a_3 + ts_3, t \in \mathbb{R}.$$

Zkrácený zápis $p \equiv \{[a_1 + ts_1; a_2 + ts_2; a_3 + ts_3], t \in \mathbb{R}\}$.

Přímku v prostoru lze také zadat jako průsečnici dvou různoběžných rovin.

Rovina ϱ v prostoru:

Je-li rovina ϱ určena bodem $A[a_1; a_2; a_3]$ a dvěma nenulovými, nekolineárními vektory $\vec{u}(u_1; u_2; u_3)$ a $\vec{v}(v_1; v_2; v_3)$ jsou její **parametrická rovnice**

$$x = a_1 + tu_1 + rv_1, y = a_2 + tu_2 + rv_2, z = a_3 + tu_3 + rv_3, t, r \in \mathbb{R}.$$

Zkrácený zápis $\varrho \equiv \{[a_1 + tu_1 + rv_1; a_2 + tu_2 + rv_2; a_3 + tu_3 + rv_3], t, r \in \mathbb{R}\}$.

Vyloučením parametrů t, r z parametrických rovnic dostaneme **obecnou (normálovou) rovnici** roviny ϱ ve tvaru

$$ax + by + cz + d = 0,$$

kde alespoň jeden z koeficientů a, b, c je nenulový.

Vektor $\vec{n}(a; b; c)$ je normálový vektor roviny ϱ .

Vzdálenost bodu $X[x_0; y_0; z_0]$ od roviny ϱ je

$$d(X, \varrho) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Příklad 10.4 Najděte rovnici roviny ρ , která prochází bodem $A[5; -1; 0]$ a má normálový vektor $\vec{n}(-1; 1; 2)$.

Řešení:

Souřadnice normálového vektoru jsou koeficienty a, b, c v obecné rovnici roviny. Tedy

$$\rho \equiv -x + y + 2z + d = 0.$$

Bod A leží v rovině, potom $-5 - 1 + 0z + d = 0 \Rightarrow d = 6$.

$$\underline{\underline{\rho \equiv -x + y + 2z + 6 = 0}}$$

Příklad 10.5 Rovina ρ je určena body $A[4; 0; 3], B[4; 1; 5], C[1; 2; -3]$. Najděte parametrické vyjádření a obecnou (normálovou) rovnici ρ .

Řešení:

Je $\vec{AB} = (0; 1; 2), \vec{AC} = (-3; 2; -6)$. Pak parametrické rovnice roviny ρ jsou

$$\underline{\underline{x = 4 + 0t - 3r, y = 0 + t + 2r, z = 3 + 2t - 6r, t, r \in \mathbb{R}.$$

Vyloučením parametrů t, r z těchto rovnic dostaneme

$$\underline{\underline{\rho \equiv 10x + 6y - 3z - 31 = 0.}}$$

Příklad 10.6 Určete vzdálenost dvou rovnoběžných rovin:

$$\rho_1 \equiv 4x - 2y - 2z - 3 = 0, \rho_2 \equiv 2x - y - z - 1 = 0.$$

Řešení:

V rovině ρ_1 volíme například bod $X(0; 0; -\frac{3}{2})$ a počítáme

$$d(X, \rho_2) = \frac{|\frac{3}{2} - 1|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{1}{2\sqrt{6}} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{6}}{12}}}.$$



10.4 Kuželosečky v rovině

Kružnice $k(S, r)$ se středem v $S[m; n]$ a poloměrem $r > 0$ má středovou rovnici

$$(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2.$$

Elipsa se středem v bodě $S[m; n]$ a poloosami (rovnoběžnými se souřadnicovými osami) velikosti a a b má středovou rovnici

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1.$$

Kružnice $k(S, r)$ 

Elipsa

Příklad 10.7 Určete rovnici kružnice k , je-li určena středem S a poloměrem r :

a) $S[0; -3]$, $r = \sqrt{2}$ b) $S[-1; 1]$, $r = 1$

Řešení:

Dosazením do středového tvaru rovnice kružnice dostaneme:

a) $(x - 0)^2 + (y + 3)^2 = (\sqrt{2})^2 \Rightarrow \underline{\underline{x^2 + (y + 3)^2 = 2}}$

b) $\underline{\underline{(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 1}}$

Příklad 10.8 Najděte střed a poloměr kružnice $k \equiv x^2 + y^2 - 5x + 4y = 2$.

Řešení:

Rovnici kružnice upravíme doplněním na úplný čtverec:

$$x^2 - 5x + \left(\frac{5}{2}\right)^2 + y^2 + 4y + 4 = 2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 4$$

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y + 2)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 \Rightarrow \underline{\underline{S\left[\frac{5}{2}; -2\right], r = \frac{7}{2}}}$$

Příklad 10.9 Rozhodněte, zda rovnice

a) $25x^2 + 16y^2 + 100x - 96y - 156 = 0$

b) $9x^2 + 4y^2 - 36x + 40y + 152 = 0$

je rovnicí elipsy. Určete střed a délku poloos.

Řešení:

a) Upravíme:

$$25(x^2 + 4x + 4) + 16(y^2 - 6y + 9) = 156 + 100 + 144 \Rightarrow 25(x + 2)^2 + 16(y - 3)^2 = 400 \Rightarrow$$

$$\frac{(x + 2)^2}{4^2} + \frac{(y - 3)^2}{5^2} = 1$$

Je tedy $S[-2; 3]$, $a = 4$, $b = 5$.



b) Podobně

$$9(x^2 - 4x + 4) + 4(y^2 + 10y + 25) = -152 + 36 + 100 \Rightarrow 9(x - 2)^2 + 4(y + 5)^2 = -16.$$

Na levé straně je číslo nezáporné, na pravé záporné, daná rovnice není rovnicí elipsy.

Hyperbola se středem v bodě $S[m; n]$ a poloosami (rovnoběžnými se souřadnicovými osami) a a b má středovou rovnici

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} - \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1 \quad \text{nebo} \quad -\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1.$$



Příklad 10.10 Najděte průsečíky hyperboly $-49x^2 + 16y^2 = -25$ s osou O_x (vrcholy hyperboly).


Řešení:

Rovnice osy O_x je $y = 0$, pak $-49x^2 = -25 \Rightarrow x_{1,2} = \pm \frac{5}{7}$.


Je tedy $V_1[\frac{5}{7}; 0]$, $V_2[-\frac{5}{7}; 0]$.

Parabola je nestředová kuželosečka. Je-li její vrchol $V[m; n]$, pak rovnice paraboly je

$$(y - n)^2 = 2p(x - m) \quad \text{nebo} \quad (x - m)^2 = 2p(y - n).$$



osa paraboly je rovnoběžná
s osou x , $p > 0$



osa paraboly je rovnoběžná
s osou y , $p > 0$

Příklad 10.11 Najděte vrchol a osu paraboly $3y^2 - 6x + 12y + 15 = 0$.

Řešení:

Upravíme na vrcholový tvar $3(y^2 + 4y + 4) = 6x - 15 + 12$, tedy $(y + 2)^2 = 2(x - \frac{1}{2})$.

Vrchol paraboly je $V[\frac{1}{2}; -2]$, osa je rovnoběžná s osou O_x , parametr $p = 1$.

Příklad 10.12 Jsou dány tři po sobě jdoucí vrcholy rovnoběžníka $ABCD$, kde $A[2; -2; 2]$, $B[4; 2; 0]$, $C[7; 4; 3]$. Určete vrchol D .

$$[D[5; 0; 5]]$$

Příklad 10.13 Najděte vnitřní úhly trojúhelníku o vrcholech $A[2; -4; 9]$, $B[-1; -4; 5]$, $C[6; -4; 6]$.

$$[\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \gamma = \frac{\pi}{4}]$$

Příklad 10.14 Pro jakou hodnotu parametru a jsou přímky p a q rovnoběžné, je-li $p \equiv 3ax - 8y + 13 = 0$ a $q \equiv (a + 1)x - 2ay - 21 = 0$.

$$[a \in \{2, -\frac{2}{3}\}]$$

Příklad 10.15 Přímka $p \equiv ax + 3y - 1 = 0$.

Určete a tak, aby přímka svírala s kladným směrem osy x úhel $\frac{3}{4}\pi$.

$$[a = 3]$$

Příklad 10.16 Najděte rovnici přímky, která prochází bodem $A[4; -2]$ a má od počátku vzdálenost $d = 2$.

$$[p_1 \equiv y + 2 = 0, p_2 \equiv 4x + 3y - 10 = 0]$$

Příklad 10.17 Najděte obecnou rovnici přímky, která prochází bodem $M[15; -3]$ a průsečíkem přímek $3x - 5y + 12 = 0$, $5x + 2y - 42 = 0$.

$$[x + y - 12 = 0]$$

Příklad 10.18 Určete množinu bodů, které mají od bodů $A[7; -3]$, $B[-2; 1]$ stejnou vzdálenost.

$$[18x - 8y - 53 = 0]$$

Příklad 10.19 Přímka p je dána rovnicemi $x = 1 + 2t$, $y = 3 - t$, $t \in \mathbb{R}$.

Určete parametrické rovnice přímky q , je-li $p \perp q$ a dále q prochází bodem $Q[1; 3]$.

$$[x = 1 + t, y = 3 + 2t, t \in \mathbb{R}]$$

Příklad 10.20 Najděte číslo n , aby body $A[3; -4]$, $B[1; n]$, $C[-1; 2]$ ležely na jedné přímce.

$$[n = -1]$$

Příklad 10.21 Najděte parametrické rovnice přímky procházející bodem $A[4; -5; 7]$ rovnoběžně

a) s osou O_x ,

b) s osou O_y ,

c) s osou O_z ,

d) s přímkou $p \equiv x = 3 - t, y = 2 + 2t, z = 3, t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} &[a) x = 4 + t, y = -5, z = 7, t \in \mathbb{R}; b) x = 4, y = -5 + t, z = 7, t \in \mathbb{R}; \\ &c) x = 4, y = -5, z = 7 + t, t \in \mathbb{R}; d) x = 4 - t, y = -5 + 2t, z = 7, t \in \mathbb{R}] \end{aligned}$$

Příklad 10.22 Určete odchylku φ rovin $\rho \equiv 2x + y - z + 1 = 0$ a $\sigma \equiv x - y + z = 0$.

$$[\varphi = \frac{\pi}{2}]$$

Příklad 10.23 Rozhodněte, která z rovin $\rho \equiv x - y - 3 = 0$, $\sigma \equiv x + y - z + 1 = 0$ má větší vzdálenost od počátku souřadnic.

$$[\text{rovina } \rho]$$

Příklad 10.24 Určete rovnici průsečnice rovin $\rho \equiv 3x + y - z = 0$ a $\sigma \equiv y + z = 0$.

$$[p \equiv x = 2t, y = -3t, z = 3t, t \in \mathbb{R}]$$

Příklad 10.25 Najděte rovnici kružnice opsané trojúhelníku o vrcholech $A[1; -1]$, $B[7; 7]$, $C[11; -1]$.

$$[k \equiv x^2 + y^2 - 12x - 3y + 7 = 0]$$

Příklad 10.26 Najděte rovnici kružnice, která se dotýká obou souřadnicových os a prochází bodem $M[2; 4]$.

$$[k_1 \equiv (x - 10)^2 + (y - 10)^2 = 100, k_2 \equiv (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4]$$

Příklad 10.27 Jsou dány body $A[1; -3]$, $B[1; 4]$, $C[-3; 5]$.
Popište jejich polohu vzhledem k elipse $25x^2 + 9y^2 = 450$.

$$[A \text{ je uvnitř, } B \text{ je uvnitř, } C \text{ je bod elipsy}]$$

Příklad 10.28 Najděte rovnici elipsy s osami rovnoběžnými se souřadnicovými, jestliže se osy O_x dotýká v bodě $A[-4; 0]$ a osy O_y v bodě $B[0; 5]$.

$$[\frac{(x+4)^2}{16} + \frac{(y-5)^2}{25} = 1]$$

Příklad 10.29 Hyperbola má rovnici $9x^2 - 4y^2 - 18x - 8y - 31 = 0$.
Najděte její střed a délky poloos.

$$[S[1, -1], a = 2, b = 3]$$

Příklad 10.30 Najděte rovnici hyperboly, jsou-li její vrcholy $V_1[0; 2]$, $V_2[8; 2]$ a prochází bodem $M[-1; 5]$.

$$[\frac{(x-4)^2}{16} - \frac{(y-2)^2}{16} = 1]$$

Příklad 10.31 Najděte rovnici paraboly, která má vrchol v počátku a prochází body $A[8; 3]$, $B[-8; 3]$.

$$[x^2 = \frac{64}{3}y]$$

Příklad 10.32 Najděte rovnici paraboly, jejíž osa je rovnoběžná s osou O_x , vrchol $V[8; 5]$, parametr $p = 4$.

$$[(y - 5)^2 = 8(x - 8)]$$

Příklad 10.33 Najděte rovnici přímky, která prochází průsečíky paraboly $y^2 = 18x$ a kružnice $x^2 + y^2 + 12x - 64 = 0$.

$$[p \equiv x - 2 = 0]$$

11 Posloupnosti a řady

11.1 Aritmetická a geometrická posloupnost

Nekonečnou posloupností se nazývá každá funkce, jejímž definičním oborem je množina všech přirozených čísel \mathbb{N} .

Konečnou posloupností nazýváme každou funkci, jejíž definiční obor je množina $\{n \in \mathbb{N}, n \leq n_0\}$, kde $n_0 \in \mathbb{N}$ je pevně dané číslo.

Posloupnost je zadána buď výčtem prvků, rekurentně, nebo vzorcem pro n -tý člen.

Příklad 11.1 Posloupnost všech čísel dělitelných třemi zapište výše uvedenými způsoby.

Řešení:

$$\{a_n\}_1^\infty = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\} \quad \text{výčet prvků}$$

$$a_{n+1} = a_n + 3, \quad a_1 = 3 \quad \text{rekurentně}$$

$$a_n = 3n \quad \text{vzorec pro } n\text{-tý člen}$$

Příklad 11.2 Je daná posloupnost $\{a_n\}_1^\infty$, $a_n = \log 3^n$. Vyjádřete ji rekurentně.

Řešení:

$$\text{Pro } \forall n \in \mathbb{N} \text{ je } a_{n+1} = \log 3^{n+1} = \log 3^n \cdot 3 = \log 3^n + \log 3.$$

Zkoumanou posloupnost lze zapsat

$$\underline{\underline{a_{n+1} = a_n + \log 3, \quad a_1 = \log 3.}}$$

Příklad 11.3 Posloupnost zadanou rekurentně $a_1 = -1$, $a_{n+1} = -a_n$ vyjádřete vzorcem pro n -tý člen.

Řešení:

$$\{a_n\}_1^\infty = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}. \quad \text{Odtud } \underline{\underline{a_n = (-1)^n.}}$$

Posloupnost $\{a_n\}_1^\infty$ se nazývá **aritmetická**, právě když existuje takové číslo d (diference), že pro každé přirozené n platí: $a_{n+1} = a_n + d$, neboli $a_{n+1} - a_n = d$.

V aritmetické posloupnosti $\{a_n\}_1^\infty$ s diferencí d platí pro každé $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

Dále jsou-li $r, s \in \mathbb{N}$ libovolná, pak $a_s = a_r + (s - r)d$.

Pro součet S_n prvních n členů aritmetické posloupnosti lze odvodit:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Příklad 11.4 Dokažte, že posloupnost $\{a_n\}_1^\infty$, $a_n = 2n - 4$ je aritmetická. Určete diferenci.

Řešení:

Musíme dokázat existenci čísla $d \in \mathbb{R}$ tak, že pro $\forall n \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} = a_n + d$.

Je $a_n = 2n - 4$, $a_{n+1} = 2n - 2$ a tedy $a_{n+1} - a_n = 2$, čili $a_{n+1} = a_n + 2$.

Posloupnost $\{2n - 4\}_1^\infty$ je aritmetická s diferencí $d = 2$.

Příklad 11.5 Rozhodněte, které z čísel 71 a 100 je členem aritmetické posloupnosti $\{a_n\}_1^\infty$, v níž $a_1 = -10$, $d = 4,5$.

Řešení:

V dané posloupnosti platí $a_n = -10 + (n - 1) \cdot 4,5$.

Je-li $a_n = 71$, pak $71 = -10 + (n - 1) \cdot 4,5$. Z toho $n = 19$.

Je-li $a_n = 100$, pak $100 = -10 + (n - 1) \cdot 4,5$. Z toho $n = \frac{229}{9}$.

Členem aritmetické posloupnosti $\{a_n\}$ je pouze číslo 71.

Příklad 11.6 V aritmetické posloupnosti je

a) $a_6 = 18$, $d = -2$. Vypočítejte a_9 .

b) $a_{16} = 20$, $d = 1,5$. Vypočítejte a_1 .

c) $a_1 = 12,6$, $d = 0,2$, $a_n = 27,4$. Určete n .

Řešení:

$$a) a_s = a_r + (s - r)d \Rightarrow a_9 = a_6 + 3d = 18 - 6 = \underline{\underline{12}}$$

$$b) a_{16} = a_1 + 15d \Rightarrow a_1 = a_{16} - 15d = \underline{\underline{-2,5}}$$

$$c) a_n = a_1 + (n - 1)d \Rightarrow n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1 = \underline{\underline{75}}$$

Příklad 11.7 Vypočítejte součet všech přirozených čísel od jedné do 300.

Řešení:

$$Je a_1 = 1, d = 1. Součet $S_{300} = \frac{300}{2}(a_1 + a_{300}) = \underline{\underline{45150}}$.$$

Posloupnost $\{a_n\}_1^\infty$ se nazývá **geometrická**, právě když existuje číslo q tak, že pro každé přirozené n platí:

$$a_{n+1} = a_n \cdot q, \text{ neboli } \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \text{ pro } a_1 \neq 0, q \neq 0.$$

Číslo q se nazývá kvocient geometrické posloupnosti.

V geometrické posloupnosti $\{a_n\}_1^\infty$ s kvocientem q platí pro každé $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Dále jsou-li $r, s \in \mathbb{N}$ libovolná, pak $a_s = a_r \cdot q^{s-r}$.

Pro součet S_n prvních n členů geometrické posloupnosti platí:

a) pro $q = 1$ je $S_n = n \cdot a_1$.

b) pro $q \neq 1$ je $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

Příklad 11.8 V geometrické posloupnosti je

a) $a_1 = 18$, $q = 3$. Napište prvních pět členů.

b) $a_1 = 4$, $q = 3$. Vypočítejte a_5 .

c) $a_6 = 8192$, $q = 4$. Určete a_4 .

d) $a_1 = 40$, $q = -\frac{1}{4}$. Vypočítejte a_5 a S_5 .

Řešení:

a) $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow \underline{\underline{18, 54, 162, 486, 1458}}$

b) $a_5 = a_1 \cdot q^4 = 4 \cdot 3^4 = \underline{\underline{324}}$

c) $a_4 = a_6 \cdot q^{4-6} = 8192 \cdot 4^{-2} = \underline{\underline{512}}$

d) $a_5 = a_1 \cdot q^4 = 40 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^4 = \underline{\underline{\frac{5}{32}}}$ $S_5 = a_1 \frac{q^5 - 1}{q - 1} = \underline{\underline{\frac{1025}{32}}}$

Příklad 11.9 Najděte geometrickou posloupnost tak, aby

$$a_1 + a_3 = 5 \text{ a } a_2 + a_4 = 10.$$

Řešení:

$$\begin{aligned} \text{Je tedy} \quad a_1 + a_1 \cdot q^2 = 5 &\Rightarrow a_1(1 + q^2) = 5 \\ a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^3 = 10 &\Rightarrow a_1 q(1 + q^2) = 10 \end{aligned}$$

Druhou rovnici vydělíme první, dostaneme $\underline{\underline{q = 2, a_1 = 1}}$.

Příklad 11.10 Zjistěte, na jakou částku vzroste vklad a_0 Kč uložený na vkladní knížku na n let, jestliže spořitelna připisuje na konci každého roku p % z částky v tom roce uložené.

Řešení:

Na konci 1. roku připíše spořitelna p % z původně vložené částky a_0 , takže vklad vzroste na částku

$$a_1 = a_0 + \frac{p}{100}a_0 = a_0\left(1 + \frac{p}{100}\right).$$

Na konci 2. roku připsá k této částce $p\%$ z a_1 , takže vklad vzroste na částku

$$a_2 = a_1 + \frac{p}{100}a_1 = a_1\left(1 + \frac{p}{100}\right).$$

Obdobně je tomu v dalších letech.

Vklady po připsání úroků v jednotlivých letech tvoří zřejmě geometrickou posloupnost s kvocientem $q = 1 + \frac{p}{100}$ a s prvním členem $a_1 = a_0q$. Tedy podle vzorce $a_n = a_1q^{n-1}$ dostaneme, že částka a_0 Kč při p -procentním složeném úrokování vzroste po n -letech na částku a_n Kč, kde

$$a_n = a_1 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^{n-1} = \underline{\underline{a_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n}}.$$

11.2 Nekonečná geometrická řada

Nechť $\{a_n\}_1^\infty$ je geometrická posloupnost, pro jejíž kvocient q platí $|q| < 1$.

Pak posloupnost $\{S_n\}_1^\infty$, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, je konvergentní a platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}$$

Takto dostáváme **nekonečnou geometrickou řadu**

$$a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} + \dots = \frac{a_1}{1 - q}.$$

Příklad 11.11 Sečtěte geometrickou řadu:

a) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} + \dots$

b) $1 + \cos^2 x + \cos^4 x + \dots$

Řešení:

a) Je $a_1 = 1$, $q = \frac{a_2}{a_1} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Dále $|q| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$, řada konverguje a

$$S = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \underline{\underline{2 - \sqrt{2}}}.$$

b) Je $a_1 = 1$, $q = \cos^2 x$.

Pro $|\cos^2 x| < 1 \Rightarrow |\cos x| < 1 \Rightarrow x \neq k\pi$ řada konverguje,

$$S = \frac{1}{1 - \cos^2 x} = \underline{\underline{\frac{1}{\sin^2 x}}}.$$

Příklad 11.12 Převedte na zlomek číslo $8,\bar{4}$.

Řešení:

$$8,\bar{4} = 8 + \underbrace{\frac{4}{10} + \frac{4}{100} + \frac{4}{1000} + \dots}_{a_1 = \frac{4}{10}, q = \frac{1}{10}} = 8 + \frac{\frac{4}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 8 + \frac{4}{9} = \underline{\underline{\frac{76}{9}}}.$$

Jiné řešení:

Na jedné straně platí, že $10 \cdot 8,\bar{4} - 8,\bar{4} = 9 \cdot 8,\bar{4}$.

Na druhé straně je $10 \cdot 8,\bar{4} - 8,\bar{4} = 9 \cdot 8,\bar{4} = 84,\bar{4} - 8,\bar{4} = 76$

Potom $9 \cdot 8,\bar{4} = 76$.

Je tedy $8,\bar{4} = \underline{\underline{\frac{76}{9}}}$.

Příklad 11.13 Závítnice byla sestrojena ze čtvrtkružnic poloměru $r, \frac{r}{2}, \frac{r}{4}, \frac{r}{8}, \dots$.
Vypočítejte její délku.

Řešení:

$$d = \frac{1}{4}(2\pi r + 2\pi \frac{r}{2} + 2\pi \frac{r}{4} + 2\pi \frac{r}{8} \dots) = \frac{2\pi r}{4}(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots) = \frac{\pi r}{2} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \underline{\underline{\frac{\pi r}{2}}}.$$

Příklad 11.14 V aritmetické posloupnosti je

a) $a_5 = 8$, $a_8 = -10$. Vypočítejte a_{20} .

b) $a_{10} = 23$, $a_{16} = 15$. Vypočítejte a_1 .

c) $a_1 = 15$, $S_{25} = 75$. Určete d .

d) $a_1 = 450$, $a_n = 210$, $d = -24$. Vypočítejte n a S_n .

e) $a_n = 47$, $S_n = 245$, $d = 5$. Vypočítejte a_1 a n .

[a) - 82, b) 35, c) - 1, d) 11, 3630 e) 2, 10]

Příklad 11.15 Ve které aritmetické posloupnosti je $a_1 + a_5 = 30$, $a_3 + a_4 = 36$?

[$a_1 = 3, d = 6$]

Příklad 11.16 Kolik členů aritmetické posloupnosti, ve které $a_1 = 2$, $d = 3$, musíme sečíst, aby součet přesáhl 2000?

[37 členů]

Příklad 11.17 Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby součet vložených členů byl 196.

$$[d = \frac{4}{5}, k = 14]$$

Příklad 11.18 *V geometrické posloupnosti je*

a) $a_4 = -\frac{8}{3}$, $a_6 = -\frac{32}{3}$. *Vypočítejte a_1 a q .*

b) $a_1 + a_4 = 112$, $a_2 + a_3 = 48$. *Vypočítejte a_1 a q .*

c) $a_1 = 6144$, $q = \frac{1}{2}$, $a_n = 48$. *Vypočítejte n a S_n .*

d) $a_1 = 18$, $a_n = 288$, $S_n = 558$. *Vypočítejte n a q .*

$$[a) \frac{1}{3}, -2, \text{ nebo } -\frac{1}{3}, 2; b) 4, 3, \text{ nebo } 108, \frac{1}{3} c) 8, 12240 d) 5, 2]$$

Příklad 11.19 *Mezi čísla 5 a 640 vložte tolik čísel, aby s danými čísly tvořila geometrickou posloupnost a součet vložených členů byl 630.*

$$[10, 20, 40, 80, 160, 320]$$

Příklad 11.20 *Najděte kvocient geometrické posloupnosti, jestliže součet příslušné geometrické řady je 6, a součet prvních pěti členů je $\frac{93}{16}$.*

$$[q = \frac{1}{2}]$$

Příklad 11.21 *Dělník souhlasil, že bude pracovat, jestliže jeho mzda bude za první den práce 1 Kč, za druhý den práce 2 Kč, za třetí den práce 4 Kč, atd. Kolik si vydělá za 12 dní práce?*

$$[4095 \text{ Kč}]$$

Příklad 11.22 *Najděte součet geometrické řady $1 - \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg}^3 x + \dots$. Stanovte podmínky.*

$$[S = \frac{1}{1+\operatorname{tg} x}; x \in (-\frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{4} + k\pi), k \in \mathbb{Z}]$$

Příklad 11.23 *Řešte rovnici $\frac{8}{x+10} = 1 - \frac{3}{x} + \frac{9}{x^2} - \frac{27}{x^3} + \dots$. Proveďte řešitelnost rovnice.*

$$[x \in \{-6, 4\}]$$

Příklad 11.24 *Do čtverce o straně a je vepsána kružnice, do ní opět čtverec, pak kružnice atd. Vypočítejte obsah všech takto vzniklých čtverců.*

$$[2a^2]$$

Příklad 11.25 *Poločas přeměny (rozpadu jader) rádia je přibližně 20 minut. Kolik rádia zbude bez přeměny z 1mg po n hodinách? (Poločas přeměny radioaktivní látky je doba, za kterou dojde k radioaktivní přeměně přibližně poloviny jader atomů té látky.)*

$$[a_n = q^n = \frac{1}{8^n}]$$

Příklad 11.26 *Pro $x \in \langle 0; 2\pi \rangle$ řešte rovnici $1 + \sin^2 x + \sin^4 x + \dots = 2\operatorname{tg} x$.*

$$[x \neq \frac{\pi}{2} \wedge x \neq \frac{3\pi}{2}, \text{ pak dostaneme } \sin 2x = 1 \Rightarrow x \in \{\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\}]$$

12 Kombinatorika

12.1 Permutace, variace a kombinace

Permutace n prvků dané základní n -prvkové množiny je každá uspořádaná n -tice těchto prvků, přičemž každý prvek základní množiny se v této n -tici vyskytuje právě jedenkrát.

Pro počet $P(n)$ všech permutací n prvků platí:

$$P(n) = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Symbol $n!$ čteme n faktoriál, definujeme $0! = 1$.

Příklad 12.1 *Kolik pěticiferných čísel je možno sestavit z číslic 0, 1, 3, 4, 7? Kolik je z nich sudých?*

Řešení:

Všech pěticifer je $P(5) = 5! = 120$.

Na prvním místě nesmí být nula, těchto pětic je $P(4) = 4! = 24$.

Celkem je pěticiferných čísel $120 - 24 = 96$.

Sudá čísla mají na místě jednotek 0, těch je

$$P(4) = 4! = 24,$$

nebo mají na místě jednotek číslici 4, ale současně nesmí mít na prvním místě číslici 0, těch je

$$P(4) - P(3) = 4! - 3! = 18.$$

Celkem je sudých čísel 42 .

Příklad 12.2 *Zmenšíme-li počet prvků o dva, zmenší se počet permutací dvacetkrát. Určete původní počet prvků!*

Řešení:

$$P(n) = n!, \quad P(n-2) = (n-2)! \Rightarrow n! = 20(n-2)! \Rightarrow n(n-1) = 20 \Rightarrow$$

$$n^2 - n - 20 = 0 \Rightarrow (n-5)(n+4) = 0$$

Číslo n je přirozené, proto původní počet prvků $n = 5$.

Variace k -té třídy z n prvků dané základní n -prvkové množiny ($0 \leq k \leq n$) je každá uspořádaná k -tice různých prvků, vybraná ze základní n -prvkové množiny tak, že **záleží** na pořadí prvků (a prvky se neopakují).

Pro počet $V_k(n)$ všech těchto variací platí:

$$V_k(n) = \underbrace{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}_{k \text{ činitelů}} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Příklad 12.3 Kolika způsoby může být odměněno zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí 13 účastníků sportovní soutěže?

Řešení:

Ze 13 sportovců vybíráme 3, záleží na pořadí - jedná se o variace.

$$V_3(13) = \frac{13!}{10!} = 11 \cdot 12 \cdot 13 = \underline{\underline{1716}}$$

Příklad 12.4 Pro kolik prvků je poměr variací druhé třídy ku počtu variací třetí třídy roven 1:20.

Řešení:

$$V_2(n) : V_3(n) = 1 : 20 \Rightarrow \frac{n!}{(n-2)!} : \frac{n!}{(n-3)!} = 1 : 20 \Rightarrow \frac{1}{n-2} = \frac{1}{20} \Rightarrow \underline{\underline{n=22}}$$

Kombinace k -té třídy z n prvků dané základní n -prvkové množiny ($0 \leq k \leq n$) je každá k -tice různých prvků, vybraná ze základní n -prvkové množiny tak, že **nezáleží** na pořadí prvků (a prvky se neopakují).

Pro počet $C_k(n)$ všech těchto kombinací platí:

$$C_k(n) = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k(k-1)(k-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

Pro kombinační číslo $\binom{n}{k}$, čteme n nad k , $0 \leq k \leq n$ platí:

$$\binom{n}{1} = n; \quad \binom{n}{n} = 1; \quad \binom{n}{0} = 1; \quad \binom{0}{0} = 1;$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}; \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1};$$

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Příklad 12.5 Ve třídě je 5 studentů a 3 studentky, kteří hrají tenis. Kolik lze sehrát zápasů, v nichž budou hrát dvě studentky proti dvěma studentům? Každá čtveřice bude hrát pouze jednou.

Řešení:

Počet dvojic studentů, které lze vybrat z pěti studentů je dán $C_2(5) = \binom{5}{2}$ (nezáleží na pořadí).

Počet dvojic studentek, které lze vybrat ze tří studentek je $C_2(3) = \binom{3}{2}$.

Počet zápasů je pak $\binom{5}{2} \cdot \binom{3}{2} = \frac{5!}{3!2!} \cdot \frac{3!}{2!} = \underline{\underline{30}}$.

Příklad 12.6 Kolika přímkami lze spojit 10 bodů, jestliže tři z nich leží na jedné přímce?

Řešení:

Každé dva různé body určují přímku, nezáleží na pořadí, tedy

$$C_2(10) = \binom{10}{2} = \frac{10!}{2!8!} = 45.$$

Třemi body (ležícími na přímce) by byly určeny tři přímky, takže počet přímek je

$$p = 45 - 2 = \underline{\underline{43}}.$$

12.2 Binomická věta

Binomická věta. Pro libovolná reálná (i komplexní) čísla a, b a pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí, že

$$(a + b)^n = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{k} a^{n-k}b^k + \dots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + b^n$$

Binomické koeficienty - kombinační čísla - lze vypočítat z Pascalova trojúhelníka:

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & & & & 1 \\
 & & & & & & \underbrace{1 \quad 1} & \\
 & & & & & \underbrace{1 \quad 2} & 1 & \\
 & & & & \underbrace{1 \quad 3} & 3 & 1 & \\
 & & \underbrace{1 \quad 4} & 6 & 4 & 1 & & \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & & \\
 & & & & & & & \text{atd.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 \binom{0}{0} & & & \\
 \binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & \\
 \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & \\
 \binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} \\
 & & \text{atd.} &
 \end{array}$$

Příklad 12.7 Umocněte podle binomické věty $(2x - \frac{3}{2})^4$.

Řešení:

$$\begin{aligned}
 (2x - \frac{3}{2})^4 &= \binom{4}{0} (2x)^4 + \binom{4}{1} (2x)^3 (-\frac{3}{2}) + \binom{4}{2} (2x)^2 (-\frac{3}{2})^2 + \\
 &+ \binom{4}{3} (2x)^1 (-\frac{3}{2})^3 + \binom{4}{4} (-\frac{3}{2})^4 = \underline{\underline{16x^4 - 48x^3 + 54x^2 - 27x + \frac{81}{16}}}
 \end{aligned}$$

Příklad 12.8 V rozvoji výrazu $(2x^2 - \frac{3}{x})^6$ určete prostý člen.

Řešení:

Označme $A_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ v obecném binomickém rozvoji.

Potom

$$A_{k+1} = \binom{6}{k} (2x^2)^{6-k} \left(-\frac{3}{x}\right)^k = \binom{6}{k} 2^{6-k} (-3)^k x^{12-2k-k}$$

Jde-li o prostý člen, pak $x^{12-2k-k} = x^0 \Rightarrow k = 4$.

Tedy pátý člen neobsahuje x a je roven

$$\binom{6}{4} (2x^2)^2 \left(-\frac{3}{x}\right)^4 = \frac{6!}{2!4!} 4 \cdot 81 = \underline{\underline{4860}}$$

Příklad 12.9 Upravte výraz

$$V = \frac{(n+2)!}{n!} - 2 \frac{(n+1)!}{(n-1)!} + \frac{n!}{(n-2)!}, \quad n \in \mathbb{N} - \{1, 2\}.$$

[2]

Příklad 12.10 V lavici je šest studentů, z nichž dva sourozenci chtějí sedět vedle sebe. Kolika způsoby je lze přesadit?

[240]

Příklad 12.11 Bylo zakoupeno 20 lístků do jedné řady v kině. Kolika způsoby je lze rozdělit mezi 10 chlapců a 10 děvčat, chtějí-li chlapci a děvčata sedět střídavě vedle sebe?

[2(10!)²]

Příklad 12.12 V kolika bodech se protíná 9 přímk, z nichž čtyři jsou navzájem rovnoběžné?

[30]

Příklad 12.13 Kolik různých signálů lze utvořit z pěti praporků různých barev, jestliže každý signál lze vytvořit umístěním jednoho až všech pěti praporků vedle sebe?

[325]

Příklad 12.14 Pro přípustné hodnoty upravte

$$\frac{(n+1)!}{(n-2)!} - 4 \frac{(n+1)!}{(n-1)!} + 9 \frac{n!}{(n-1)!}.$$

[$n(n-2)^2$ pro $n \geq 2$]

Příklad 12.15 *Z kolika prvků dostaneme 380 variací druhé třídy?*

[20]

Příklad 12.16 *Řešte v \mathbb{N} rovnici*

$$\binom{x-1}{x-3} + \binom{x-2}{x-4} = 9.$$

[$x = 5$]

Příklad 12.17 *Řešte v \mathbb{N} nerovnici.*

$$\frac{(n-1)!}{(n-3)!} < 2 \binom{9}{7}$$

[$n \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$]

Příklad 12.18 *V rozvoji $\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2}\right)^{10}$ určete $x \in \mathbb{R}$ tak, aby pátý člen rozvoje byl roven 105.*

[$x = \frac{1}{8}$]

Příklad 12.19 *Který člen rozvoje $\left(\frac{1}{x} + 2x^3\right)^{10}$ obsahuje x^6 ?*

[pátý]

Příklad 12.20 *Najděte komplexní číslo $\left(\frac{i\sqrt{3}-1}{2}\right)^6$.*

[1]

Reference

- [1] Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky. Praha, Prometheus, 1999.
- [2] Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy. Brno, FEI VUT, 2000.
- [3] Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha, Prometheus, 2002.
- [4] Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II. Praha, Prometheus, 1999.